

징크셀포르테정

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

[제품명] 징크셀포르테정

[원료약품 및 그 분량] 1정(625.000 mg) 중

■ 유효성분

아셀렌산나트륨오수화물(EP) ··· 0.666mg(셀레늄으로서 200ug)

산화아연(KP) ············ 24.977mg(아연으로서 20mg)

토코페롤아세테이트 2배산(KP) ···· 20.00mg(비타민E로서 10IU)

콜레칼시페롤과립(별규) ···· 10.000 mg(비타민 D로서 1,000 IU)

■ 첨가제(타르색소) : 청색2호, 황색5호, 황색203호

■ 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 수크랄로스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB노란색(80W22608), 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨

[성상] 노랑색의 장방형 필름코팅정

[효능 · 효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E의 보급 1) 임신 · 수유기 2) 발육기 3) 노년기 4) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
2. 아연의 보급 3. 셀레늄의 보급

[용법 · 용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 6) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 7) 신장장애 환자 8) 저단백혈증 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈

모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험 이 증가될 수 있다. 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 5) 항알도스테론제, 트리아메텐과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 6) 우발적으로 과량복용 한 경우 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병

[제조사] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[판매자] 알엠에스코리아주식회사 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 181번길 4-19

[소비자 상담전화] 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 기타주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용 시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다. 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁해결기준”에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다. ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)