

일반의약품 정보

이 약을 사용(복용)하기 전에 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】 1정 중
L-카르니틴(USP) 330mg

【용법·용량】
성인 : 엘-카르니틴으로서 1일 2~3g을 2~3회 분할 경구투여한다(먹는다, 복용한다) 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【효능·효과】
1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약에 과민증 환자

2. 부작용
일시적인 구역·구토, 복통(배아픔), 설사, 체취가 나타날 수 있다. 이 약을 복용한 환자에서 발진, 두드러기, 안면부종(얼굴부기)이 보고되었다. 이 약을 복용한 요독증 환자에서 경증(경증상, 가벼운 증상)의 근무력증(근육무력증)이 보고되었다

3. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유 중에는 신중히 투여한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 90 정/상자(10정/PTP X 9)

【첨가제】 ▪ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 포비돈, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 결정무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(91W243), 탭실드흰색(29W1600)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 기재사항을 주의깊게 읽어보시고 본 기재사항을 항상 약과 함께 보관하십시오.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
※ 본 기재사항 작성(제개정)년월일 이후 변경된 내용은 제품문의 또는 의약품안전나라 의약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.

개정연월일: 2026.07.03[V.01]

【제조사】 **SUNGYI** 성이바이오제약 주식회사
BIO Pharm.

강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층
소비자 상담 및 제품문의 : (02)3413-3358, www.sungyi.co.kr

제조번호 :
사용기한 :

29x11mm
8 800724 006201

일반의약품

Elocan tab.

엘로칸 정
(L-카르니틴)

90정

이 약은 인습(흡습)성이 강하므로 보관 및 조제 시 주의하시기 바랍니다.