

바로엘정

500정

일반의약품 조제용

■ 원료약품 및 그 분량 (1정 중)

- 유효성분: 수산화마그네슘(KP) 250mg
우르소데옥시콜산(KP) 5mg
노회엑스(BP) 50mg
- 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드흰색(11W 1554), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕 부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1~2정, 1일 2회 아침, 저녁 공복시 (식전 또는 식간)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2)

PLA50T5H E01

장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【제조·외주자】 ㈜인트로바이오파마 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12, 104-2 1동 1층(일부) 및 2층(일부)(보관소)

【제조자】 한국셀슨제약㈜ 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 271-8

【판매자】 더메디어트㈜ 부산광역시 수영구 수영로642번길 93, 2층

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 포장의 기재사항 작성일자(2026년 06월 16일) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(www.intropharm.com)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)으로 문의 바랍니다.



HDPE
뚜껑: LDPE
재활용 어려움



(01)08800524024313

제조번호 :

사용기한 :