

코엔자임큐텐, UDCA 함유

액티브네오 연질캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

· 유효성분 : 아스코르브산(USP)	500mg
· 토코페롤아세이트(KP)	200mg
(비타민E로서 200IU)	
· 산화아연(KP)	17.43mg
(아연으로서 14mg)	
· 셀레늄 가루0.1%(KP)	25mg
(셀레늄으로서 25μg)	
· 베타-카로틴 현탁액30%(KP)	10mg
(β-카로틴으로서 3mg)	
· 유비데카렌(KP)	10mg
· 우르소데옥시콜산(KP)	10mg
· 벤포티아민(KP)	10mg

- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호
- 첨가제(동물유래) : 숙신산젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
- 기타첨가제 : 공기물, 백산, 레시틴, 농글리세린, 소르비톨 액(비결정성), 에틸비닐린, 산화티탄

[성상] 적갈색의 내용물을 함유한 입자색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과]

다음경우의 비타민 A, E, B, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 눈의 건조감의 완화
- 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
- 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 경고.

1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만(1세 미만)의 대만 용법에 있는 경우
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria) : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발생(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이나 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍 증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
 - ② 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 구한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자

8) 저단백혈증 환자

9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

11) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고광량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤르비전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 장기간 고광량의 비타민 B(비타카로틴으로부터 전환된 것을 제외함) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈약성증) 위험을 높일 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오
- 6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불분명하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 60 캡슐/상자(10캡슐/PTP포장X6)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상 규정"에 의거 소비자의 정당할 피해는 보상하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국약물안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
 ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329 (소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

※문안작성일자:2026.05.26(rev.0)

[제조외의 및 판매자] (주)씨엠지제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조자] (주)씨흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61