

돌코리퀴젤

장용연질캡슐

비사코딜 5mg / 우르소데옥시콜산 10mg /
도큐세이트나트륨 21mg

[원료약품 및 그 분량]

1캡슐(405.0mg) 중

■ 유효성분

비사코딜 (KP)	5.0 mg
우르소데옥시콜산 (JP)	10.0 mg
도큐세이트나트륨 (USP)	21.0 mg

■ 첨가제(동물유래성분)

젤라틴(돼지, 가축)

■ 기타 첨가제

콩기름, 아자경화유, 황납, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 비결정성 소르비톨액, 펙틴, 황색 산화철, 산화티탄

[성상]

■ 미황색의 유상 내용물을 함유한 황색의 타원형 연질캡슐

[효능 효과]

■ 변비

■ 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕 감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법 용량]

15세 이상 및 성인: 1회 1~2캡슐씩 1일 1회 취침시 (공복시) 복용한다.

다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 나트륨 제한식을 하고 있는 사람
- 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지 하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 20캡슐/상자(10캡슐/PTP*2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[제조원] 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부


[판매원] 오펠라헬스케어코리아(주)/ 서울시 강남구 테헤란로 431, 12층

[소비자상담실] 080-050-3535

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어아하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2026년 07월 16일) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

1. 돌코리퀴젤 장용연질캡슐은 우리몸에서 어떻게 작용하나요?

돌코리퀴젤 장용연질캡슐의 주성분인 비사코딜은 장내 근육에 직접 작용하여 건강한 장과 유사한 운동²을 발생시키고, 일주기 리듬에 맞춰 복용하면 자연스러운 배변활동이 가능합니다. 즉, 생체 리듬의 주기에 맞춰 작용이 가능한 크로노테라피(시간치료) 요법 제제입니다. 따라서 예측 가능한 효과를 기대할 수 있습니다.



*고진폭추진성수축(High Amplitude Propulsive Contraction): 100 mmHg 이상의 실제 배변 전 나타나는 장의 추진운동, 하루 평균 약 6회 발생

2. 변비약은 중독되나요?

미국소화기학저널(American Journal of Gastroenterology)에서 2005년에 발표한 결과에 따르면 약물에 대한 중독은 약물이 중추신경계로 들어가서 뇌의 도파민 시스템에 국소적으로 영향을 미칠 때 발생하게 되는데, 대부분의 완화제는 뇌혈관 장벽(blood brain barrier)을 거의 통과하지 않습니다.⁵



3. 돌코리퀴젤 장용연질캡슐은 어떻게 다른가요?

특허받은 장용성 연질캡슐 기술을 적용하여 위와 소장을 지나 대장에서 작용하도록 설계되었습니다. 액상 제형의 연질캡슐로 부드러운 복용감을 제공하며, 장 내에서 보다 균일하게 퍼져 작용할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 필요한 부위에서 효과적으로 작용하도록 설계된 것이 특징입니다.

¹ Monali P. Walke, Review on Constipation in Adults, International Journal of Current Research and Review, 2021; 131020

² Hamid 1998. J Pediatric Gastroenterol Nutr 1998; 27(4) 398-402

³ 대한민국 등록 특허 제10-1607459호, 장용성 연질캡슐용 피막매스 조성물

⁴ Duboc H, et al. Disruption of Circadian Rhythms and Gut Motility; An Overview of Underlying Mechanisms and Associated Pathologies. J Clin Gastroenterol 2020;54(5). 405-414.

⁵ Boucha 2023. Drugs - Real World Outcomes(2023) 10 249-261

⁶ Müller-Lissner SA et al. Myths and Misconceptions About Chronic Constipation. Am J Gastroenterol. 2005;100:232-242.