

프란케어정 50밀리그램 (프란루카스트수화물)

Pran-care Tab. 50mg (Pranlukast hydrate)

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【현로약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 : 프란루카스트수화물(별규) 50.0 mg
첨가제(동등물류): 유당수화물(소, 우유)
기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈6000, 몰록사마407, 전호화천분, 크로스포비돈, 크로스카르멜로소스나트륨, 클로이드스이산하루스, 스테아르산마그네슘, 오파드라아I(AMB한색(88A180040))

【성상】

분할선이 있는 흰색 또는 연한 노란색의 정방형의 필름코팅정

【효능·효과】

1. 기관지 천식
2. 알레르기성 비염

【용법·용량】

성인 : 프란루카스트수화물로서 1회 50mg을 1일 2회 아침, 저녁 식후 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응을 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

- 1) 쇼크 : 쇼크 또는 анафилакти시모양 증상(빈도불명)이 나타날 수 있으므로 주의감에 관찰한다. 할암저하, 의식장애, 호흡 곤란, 발진 등의 증상이 나타나면, 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 혈액계 : 백혈구감소(초기증상 : 발열, 인후통, 전신관통 등), 혈소판감소(초기증상 : 자반, 코피, 지혈출혈 등)의 출혈 경향이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 간장 : 황달, AST, ALT의 상승 등을 동반하는 간기능장애가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하여 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 때때로 빌리루빈 상승, 드물게 ALP 상승 등이 나타날 수 있다.
- 4) 호흡기계 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 비정상, 호산구증가 등을 수반한 간질성 폐렴과 호산구성 폐렴(0.02%)이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 발현될 경우에는 투약을 중지하고 부신피질호르몬 투여와 같은 적절한 처치를 한다.
- 5) 근골격계 : 횡문근융해가 나타날 수 있다. 근육통, 무력감, CK(CPK) 상승, 마이오글로빈 상승 등의 증상이 발현될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한, 횡문근융해로 인한 급성신장장애의 발생에도 주의하여야 한다. 드물게 관절통이 나타날 수 있다.
- 6) 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기, 드물게 가려움, 다형성출혈반 등이 나타날 수 있으므로 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 7) 정신신경계 : 진전, 경련, 불면, 때때로 두통, 졸음, 어지러움, 드물게 불면, 자해, 마약이상이 나타날 수 있다.
- 8) 소화기계 : 때때로 구역, 복통, 위부불쾌감, 설사, 드물게 구토, 속쓰림, 식욕부진, 변비, 복부팽만감, 구내염, 혀염, 하비타 기 나타날 수 있다.
- 9) 순환기계 : 드물게 부정맥(빈맥 · 심방세동 · 기와수축 등), 심계항진, 흉조가 나타날 수 있다.
- 10) 비뇨기계 : 드물게 단백뇨, 요침혈, 빈뇨 빈도불명의 요양강소 및 배뇨장애가 나타날 수 있다.
- 11) 기타 : 경직, 무력, 체중증가, 유무증, 수전증, 각막증가, 기침, 위양성, 탈모, 월경불순, 드물게 흉부교역감, 부종, 권태 감, 트리카르세라이드 상승, 출혈, 호산구증가증, 인두불쾌감, 구갈, 이명이 나타날 수 있다.
- 12) 기관지천식에 사용시
(1) 국외/일본에서 승인시 조사부터 시판후 조사까지 이상반응감계의 대상이 된 4933례중 174례(3.5%)에서 216건의 이상 반응(임상감사지 이상 포함)이 나타났다. 주요한 것은 발진 : 가려움(30%(0.6%), 복통 : 위부불쾌감이 29례(0.6%), 설사 19례(0.4%), 구역 15례(0.3%), AST · ALT 상승 등의 간기능이상 17례(0.3%), 빌리루빈 상승이 7례(0.1%) 등이다.
(2) 국내에서 6년 동안 3,271례를 대상으로 실시한 시판후 조사 결과 160례(4.9%)에서 이상반응이 보고되었고 주된 이상 반응은 소화불량 34례(1.0%), 가려움 30례(0.9%) 등이다.
- 13) 알레르기성 비염에 사용시
(1) 국외/일본에서 승인시 조사부터 시판후 조사까지 이상반응감계의 대상이 된 4277례중 200례(4.7%)에서 258건의 이상반응(임상감사지 이상 포함)이 나타났다. 주요한 것은 설사 42례(1.0%), 복통 : 위부불쾌감 35례(0.8%), 발진 : 가려움 24례(0.6%), 졸음 17례(0.4%), 구역 13례(0.3%), AST · ALT 상승 등의 간기능이상 8례(0.2%), 빌리루빈 상승 8례(0.2%) 등이다.
(2) 국내에서 4년동안 666례를 대상으로 실시한 시판후조사 결과 4례(0.6%)의 이상반응이 보고되었고, 주된 것은 가려움 2례(0.3%)였다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약은 기관지확장제, 스테로이드제 등과는 달리 이미 일어나고 있는 천식발작을 경감시키는 약물이지 아니므로, 이것을 환자에게 충분히 설명할 필요가 있다.
- 2) 이 약의 투여중에 대발작이 일어난 경우는 기관지확장제 또는 스테로이드제를 투여할 필요가 있다.
- 3) 장기 스테로이드요법을 받고 있는 환자 중, 이 약의 투여에 의해 스테로이드를 감량하는 경우에는 충분한 관리하에 천천히 한다.
- 4) 이 약의 투여에 의해 스테로이드 유지량을 강량한 환자 중 이 약의 투여를 중지하는 경우에는 원질적 재발의 우려가 있으므로 주의한다.
- 5) 이 약을 포함하여 류크트리알릴칼제 사용시에 Chung-Strauss 증후군과 같은 혈관염이 나타났다는 보고가 있다. 이들 증상은 대체로 경구스테로이드제의 감량 · 중지시에 나타나고 있다. 이 약 사용시는 호산구수, 혈관염증상(자립, 사지 약화, 발열, 관절통, 폐의 침윤 등) 등의 추이에 주의한다.
- 6) 다른 류크트리알릴칼제를 투여 받은 환자에서 인과관계는 명확하지 않으나 우울증, 자살생각, 자살 및 공격적 행동 등의 정신 증상이 보고되었으므로 이 약을 투여한 후 환자의 상태를 주의 깊게 관찰해야 한다.
- 7) 이 약의 투여에 의해 효과가 나타나지 않을 경우에는, 장기전에 걸쳐 투여하지 않도록 주의한다.

4. 상호작용

- 1) 이 약은 in vitro 시험에서 CYP3A4에 의해 대사되어, 이들 약물의 대사를 경쟁적으로 저해하므로 주로 CYP3A4에 의해 대사되는 약물과 병용투여시 주로 CYP3A4에 의해 대사되는 약물의 혈중농도가 상승할 가능성이 있다.
- 2) 이 약의 대사는 in vitro 시험 및 in vivo 시험에서 CYP3A4를 저해하는 약물에 의한 이 약의 대사가 저해된다는 보고가 있으므로 CYP3A4를 저해하는 약물(이트라코나졸, 에트리트라마진 등)과 병용투여시 이 약의 혈중농도가 상승할 가능성이 있다.
5. 일부 및 수유부에 대한 투여
일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는, 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다 (임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않다.).
6. 소아에 대한 투여
저체중출생아, 신생아, 영아 또는 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 많지 않다.).
7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(예를 들어, 1회 성인 용량의 1/2을 1일 2회)하는 등 주의한다.
8. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

9. 의약품동등성시험 정보

- 가. 시험약 휴프란정50밀리그램(프란루카스트수화물)(㈜휴온스)과 대조약 씨투스정50mg(프란루카스트수화물)(삼이제약)
예) 을 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 얻은 혈중 프란루카스트를 측정하여 결과, 비교 평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계 처리하였을 때, 기하평균비율의 90% 신뢰구간이 80.00~125.00% 이내에서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	씨투스정50mg (프란루카스트수화물) [삼이제약임]	1581±638	377.3±157.3	2.25 (0.75-6.00)	3.15±1.28
	휴프란정50밀리그램 (프란루카스트수화물) [㈜휴온스]	1502±773	364.1±177.0	2.5 (0.75-6.00)	2.77±1.07
기하평균비율의 90% 신뢰구간 (기준 : 80.00~125.00%)		85.91~98.37%	87.69~101.69	-	-
(AUC, C _{max} , t _{1/2} : 평균값 ± 표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n = 59) AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 17까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 밀단 소실 반감기					

나. 이 약은 (㈜휴온스의 휴프란정50밀리그램(프란루카스트수화물)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 제조하였음. 같.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30정/병, 300정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성연월일 이후 변경된 내용은 '의약품통합 정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.
- ※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

작성연월일 : 2026. 06. 04
ZPC-00

제조외곽자

㈜ 휴온스메디텍

부산광역시 강서구 녹산산업1로 22



제조자

㈜ 휴온스생명과학

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 70