Dongkook Pharmaceutical

일반의약품

외음부 질염 치료엔—

동국 지노멜라 질연질캡슐

3가지 유효균종에 작용 ❀ 세균 · 칸디다균 · 트리코모나스

40151-00
GNVI-001

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1964.42mg) 중,
- 유효성분 : 니푸라텔(별규) ····· 500mg
  니스타틴(EP) ····· 45.455mg(니스타틴으로서 200,000IU)
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(기원 : 소, 사용부위 : 가죽)
- 기타첨가제 : 글리세린, 디메티콘100, 이산화티탄, 중쇄트리글리세리드, 황색산화철E172

[성상]
노랑색의 유상 내용액이 든 연한 노랑색의 타원형 질연질캡슐제

[효능·효과]
- 유효균종 : 칸디다균, 트리코모나스, 세균
- 적응증 : 외음부 질염

[용법·용량]
성인 1회 1정, 1일 1회 질내에 깊숙이 삽입한다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
니스타틴 또는 니후라텔에 과민반응이 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 문서를 소지할 것
1) 이 약 투여에 의해 국소종창(부기), 발적(충혈되어 붉어짐), 반구진성발진, 가려움, 화끈거림, 질자극감, 질 분비물, 질 건조감, 질 알레르기증상, 생리 지속 등의 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중단한다.
2) 장기 투여 시 감작(과민상태로 만듦)현상이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용하고, 만약 감작(과민상태로 만듦)증상이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 성관계기간 동안에는 사용을 피한다.
2) 이 약은 국소용이므로 내복하지 않는다.

[저장방법]
기밀용기, 실온보관(1~30°C)

[포장단위]
6캡슐/상자(6캡슐/PTP)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.
※ 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-550-7575 : 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.
※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

- 수 입 자 : **동국제약(주)** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
- 제 조 자 : **PHIL Inter Pharma Co., Ltd.** /
  No. 20, Huu Nghi Boulevard, Vietnam - Singapore Industrial Park (VSIP), Binh Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

설명서 최종 개정 연월일 : 2026. 06. 12

Dongkook 동국제약