

# 부스트엘정

(시트룰린말산염)

HL-2605-01

일반의약품

조제용

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염 (별규) ..... 500mg
- 기타 첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 침강탄산칼슘, 카르나우바납, 크로스포비돈, 톨크, 탭실드노란색(29Y1543), 탭실드흰색(11W001)

## 【성상】 노란색의 타원형 필름코팅정

## 【효능·효과】 기능 무력증의 보조치료

## 【용법·용량】

성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 3회 복용한다.  
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 2정, 1일 2회 복용한다.  
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

## 【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.  
6세 미만의 유아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.  
1) 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)  
2) 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)  
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항  
1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.  
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것  
3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.
- 저장상의 주의사항  
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.  
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

## 【포장단위】 42정/병, 84정/병

## 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

## 【제조의뢰자】 에이치엘비제약(주) / 경기도 남양주시 경강로 27

## 【제조사】 (주)한국팜비오 / 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업9로 36

- 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
- 기타 자세한 사항이나 문서의 작성(개정)일자(2026.05.28) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.
- 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)