

릴렉신^정

【원료약품 및 분량】 1정(381 mg) 중

- 유효성분 : 클로르자손(KP) 150 mg
에텐자미드(KP) 150 mg
카페인수화물(USP) 25 mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산 나트륨, 폴리알렌글리콜6000, 히드록시프로필메타셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

흰색의 원형 필름 코팅정

【효능·효과】

신경통, 요(허리)통, 어깨 결림

【용법·용량】

성인 1회 1~2정 1일 2회 동통(통증) 또는 발작 시에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이), 유아 및 어린이(14세 이하).
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 고령자(노인).

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.

7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.
- 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 3) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30 ℃) 보관

【포장단위】 10정/PTP

【사용기한】 외무포장참조

【판매자】 SK케미칼(주) / 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

【제조사】 (주)와이에스생명과학 / 경기도 이천시 모가면 공원로 133-1
제품상담 전용 전화 (080-021-3131)

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질·변태 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국에서 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에서 할 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.