

조제용

마이핏캡슐

(사카로마이세스보울라르디균 10mg, 디메티콘 12mg)

500캡슐

■ 원료약품 및 그 분량 1캡슐(215밀리그램) 중

· 유효성분:

사카로마이세스보울라르디균(별규)사카로마이세스보울라르디균(으로서 1.8×10^8 CFU).....10mg

디메티콘(DP).....12mg

· 첨가제(동물유래성분): 유당수화물소, 우유, 캡슐젤라틴(소, 돼), 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상 미황색 과립이 충전된 상·하부 미황색의 경질캡슐제

■ 효능효과 장장, 변비, 묽은 변, 복부 팽만감, 장내이상발효

■ 용법용량 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 1캡슐

■ 사용상의 주의사항 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이(캡슐제, 정제(추어불정 및 발포정 제외) 및 환제) 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 2주(호모생균제제, 생약만으로 된 제제는 2주를 1개월로 바꿀 수 있다) 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용·잘못사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. ■ 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 사용기간 제조일로부터 36개월 ■ 판매자 한국프라임제약/ 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ 제조사 메디스제약(주)/ 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170 ■ 소비자상담실 080-811-3011

판매자

Prime

한국프라임제약

제조사

Medix

메디스제약

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

■ 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

■ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

개정일자: 2026.07.28 (Rev.01)

제조번호:

사용기한: