black

180 x 200

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며,
첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
첨부문서 작성일자 : 2026년 07월 14일

일반의약품
319 기타의 비타민제

육체피로와
신경통 동시 개선

쎈비큐 액트비정

[원료약품 및 그 분량] 1정(887 밀리그램) 중
유효성분

벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 72.31 mg)	100 mg
리보플라빈부티레이트(KP)	12 mg
니코틴산아미드(KP)	100 mg
판토텐산칼슘(KP)	100 mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	5 mg
D-비오틴(USP)	0.5 mg
폴산(KP)	0.5 mg
메코발라민(KP)	1000 μg
아스코르브산(KP)	100 mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D로서 1,000 I.U)(동물유래 : 양, 양모)	10 mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 35.1 μg)	65 mg
감마-오리자놀(KP)	10 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 18 mg)	30 mg
산화아연(KP)(아연으로서 16 mg)	20 mg
우르소데옥시콜산(KP)	10 mg
이노시톨(KP)	30 mg

기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭쉴드갈색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능 · 효과]
1. 다음 경우의 비타민 D, B_1, B_2, B_6, C의 보급 육체 피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로

3. 아연의 보급

[용법 · 용량] 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용합니다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
3) 만 12개월 미만의 젖먹이
4) 신장(콩팥)결석 환자
5) 심한 중상의 신부전 환자
6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
5) 심장·순환 기계기능 장애 환자
6) 신장(콩팥) 장애 환자
7) 저단백혈증 환자
8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
10) 임부
11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분) 팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
3) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B_{12}를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
8) 우발적으로 과량복용 한 경우
9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치 에 영향을 줄 수 있습니다.
4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전, 후에는 피하십시오.

6. 일반적 주의
1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관합니다.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60 정/병, 120 정/상자(60정/병×2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8070
boryungconsumer.co.kr

BORYUNG 보령컨슈머헬스케어 Medix 메딕스제약 진양제약

[판매자] 보령컨슈머헬스케어(주) 서울특별시 종로구 창경궁로 136
[제조자] 메딕스제약(주) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170
[제조의뢰자] 진양제약(주) 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34

WK-00,00