일반의약품

코막힘에 효과 빠른 비염 증상 완화 솔루션

# 그린노즈 스트롱

연질캡슐

이 약을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

**[원료약품 및 그 분량] 1 캡슐 중**

유효성분 : 수도에페드린염산염(USP) ..... 25 mg
벨라돈나총알칼로이드총 알칼로이드(으)로서 0.2mg)(JP) ..... 0.2 mg
클로르페니라민말레산염(KP) ..... 4 mg

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가죽)(돼지, 가죽)
기타 첨가제 : 농글리세린, 부틸하드록시톨루엔, 소르비톨소르비탄액, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜 400, 폴리에틸렌글리콜 600, 프로필렌글리콜

**[성상]** 미황색의 투명한 내용물을 함유한 미황색의 투명한 타원형 연질캡슐

**[효능·효과]** 코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후(목구멍)통, 머리 무거움

**[용법·용량]** 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 매 식후에 복용한다.

**[사용상의 주의사항]**

**1. 경고**

**수도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEPP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.**

**발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.**

**2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**

1) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
4) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자 5) 중증 급성 또는 만성 신장(콩팥)질환/신부전 환자

**3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**

다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(기래약), 멀미약, 알레르기용약 등)

**4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.**

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눔)곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
4) 고령자(노인) 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
7) 수도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배아픔), 직장 출혈 등)이 발현될 경우

**5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.**

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 눔)곤란, 두통, 안면홍조(붉어짐), 비정상적인 눈부심
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 쇽(아나필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군 : 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

**6. 소아에 대한 투여**

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

**7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항**

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. 4) 복용시에는 음주하지 말 것.

**8. 저장상의 주의사항**

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**[포장단위]** 10캡슐 / PTP

**[제조자] 코스맥스파마(주)** 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

**※ 이 제품은 햇빛을 받는 경우 변색 가능성이 있으므로 반드시 차광하시기 바랍니다.**

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 작성일자(2026년 9월 18일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.gcbiopharma.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조의뢰 및 판매자

GC 녹십자

(주)녹십자

충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL.(031)260-4300 소비자상담실 TEL.080-260-0033
www.gcbiopharma.com

설명-10-1639-1