일반의약품

# 엔에이디정 (니코틴산아미드)

**[원료약품 및 그 분량]** 1정(643.300밀리그램) 중
- 유효성분: 니코틴산아미드(KP) ····· 500mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호, 황색 5호, 청색 2호
- 기타첨가제: 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭쉴드주황색(29O1491), 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

**[성상]** 주황색의 타원형 필름코팅정

**[효능 · 효과]** 니코틴산아미드 결핍의 치료

**[용법 · 용량]** 성인 1일 1회 1정을 물과 함께 복용한다.

**[사용상의 주의사항]**

**1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것**
(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

**2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것**
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상적 경험이 없기 때문에, 니코틴산아미드 결핍이 명확히 확인된 경우를 제외하고는 복용을 권장하지 않는다)
(3) 수유부(수유 중에는 복용을 권장하지 않는다)
(4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

**3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것**
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 홍조, 가려움증
(2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia:혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
(3) 우발적으로 과량 복용한 경우
(4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

**4) 기타 이 약의 복용시 주의사항**
(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
(2) 여러 약물 간 발생할 수 있는 상호작용을 방지하기 위해, 처방중인 다른 치료에 대해 의사나 약사에게 반드시 알려야 한다.

**5) 저장상의 주의사항**
(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**[포장단위]** 100정/병

**[저장방법 및 사용기간]** 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관, 제조일로부터 36개월

**[제조의뢰자]** ㈜중헌제약, 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 28 공장동

**[제조자]** ㈜노바엠헬스케어, 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

※ 제품 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
※ 제품을 사용한 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
※ 첨부문서에 기재되어 있지 않은 부작용이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 알리십시오.
※ 사용(유효)기한이 경과한 의약품은 사용하지 마십시오.
※ 첨부문서 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug)에서 확인 하실 수 있습니다.
※ 제품관련 문의사항은 <(주)중헌제약 : 02-6928-9114>로 문의바랍니다.

개정년월일: 2026.08.27
M2353-V00

중헌제약