일반의약품

소화불량 · 속쓰림까지 한 번에!

제스판 맥스 정

제품정보 QR 코드

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】
이 약 1정(491.950 밀리그램) 중
유효성분: 감초가루(생규) 25mg (글리시리진산으로서 0.63mg), 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(별규) 20mg (전분당화력(pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위로서), 리파제(KP) 7.5mg (지방소화력(pH 6.0) 45 단위로서), 메타규산알루민산마그네슘(KP) 40mg ((건조물이며) 산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg), 스코폴리아엑스(KP) 5mg (총알칼로이드[히요스시아민 및 스코폴라민]로서 50㎍), 침강탄산칼슘(KP) 100mg, 탄산수소나트륨(KP) 50mg, 트리메부틴말레산염(KP) 50mg
첨가제(타르색소): 황색203호,청색1호,청색2호
동물유래성분: 유당수화물(소,우유)
기타첨가제: 박하유, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 유당수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭쉘드녹색(99G1260), 포비돈

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】
위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 투석요법을 받고 있는 환자
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움등)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3) 신장애(신장장애) 환자
4) 간장애 환자
5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
6) 인산염 저하가 있는 환자
7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
3) 부종(부기)이 있는 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

6. 부작용
1) 이 약을 투여함으로서 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.

7. 일반적 주의
1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킵니다.
2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않습니다.
4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

8. 상호작용
위장진통, 진경제(경련완화제)와 병용 투여(함께 복용)하지 않습니다.

9. 소아,임부에 대한 투여
1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않습니다.
2) 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않습니다.

10. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관합니다.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10 정/피티피(10정/PTP X 1)

※ 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

제조의뢰자 :
종근당
충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)
제품상세정보 : www.ckdpharm.com 참조

제조자 :
㈜노바엠헬스케어
경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
이 첨부문서 작성일자(2026.08.25)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화 (080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.