원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

- 유효성분: 사카로마이세스보울라르디균(별규) …… 282.5mg (생균수로서 5X10^{9}개), 피리독신염산염(KP) ……4mg
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐

조제용 일반의약품

알리플 캡슐

250

100 캡슐

Arlico 알리코제약㈜

성상 미황색의 분말이 든 상,하 백색의 경질캡슐제 **효능·효과** 정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효 **용법·용량** 다음과 같이 연령에 따라 1일 3회 복용한다. 성인 및 만 15세이상 : 1회 1~2캡슐 만 8세 이상 - 만 15세미만 : 1회 1/2~1캡슐 **사용상의 주의사항** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증또는 포도당-갈락토오스 흡수장애등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223,14-3330) ※본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다. ※구입 시 사용기한이 경과되었거나, 유통 과정 중 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

학술정보문의 080-585-0004

일부공정위탁제조(제조의뢰자)

알리코제약(주)

충청북도 진천군 광혜원면 용소2길21

일부공정위탁제조(제조자)

한화제약(주)

강원특별자치도 춘천시 남면 약암길 109

(01)08806560060711

플라스틱 HDPE 뚜껑:LDPE

제조번호

사용기한

30 x 14 mm

01/202609