

해열, 진통, 소염제

일반 의약품

분류번호 : 114

다아펜^정

원료약품 및 그분량 : 1정(700mg) 중

아세트아미노펜(약전) 450mg

DL-메티오닌(약전) 45mg

동물유래성분 : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

성 상 : 백색의 장방형 정제

효능·효과 : 두통, 치통, 발치(이를 뽑음)후 동통(통증), 인후통(목구멍통증), 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통(허리통증), 근육통, 건통(어깨통증), 타박통, 골절통, 월경통(생리통), 외상통(상처통증)의 진통, 오펜(출고 떨리는 증상), 발열시의 해열

용법·용량 : 성인 1회 1~2정 1일 3~4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 어린이(7~14세) : 1회 1/2정

사용상의 주의사항

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 알친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기증상 (예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기)·유아 및 어린이 (14세 이하)
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자(노인)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약물들과 동시에 복용하지 말 것 - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 메치오닌과 레보도파의 병용투여(함께 투여)시 레보도파의 효과를 억제할 수 있으므로 의사, 약사와 상의할 것
- 4) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 다음 사람은 복용하지 말 것.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상 (예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) (후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

6. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증(머지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 3) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

포장단위 : 자사포장단위

저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 : 제조일로부터 36개월

☎ 소비자상담실 : 031)672-3431, www.miraepharmkorea.co.kr

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→(정보마당)→(의약품정보)에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2009. 12. 31