

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
- 구성 성분에 과민증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
 - 3) 파킨슨병 치료제인 '레보도파'성분의 의약품과 이 약과 함께 복용하는 경우에는 파리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 혈중농도를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약될 수 있으므로 이 약과 함께 사용시 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 피부 : 발진, 발적이 나타날 수 있다.
 - 3) 이 약의 투여에 의해 생리과 이상보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 이 약이 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 5) 이 약에 함유된 파리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 갑상선병변 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 용량을 지킬 것
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
- 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 물수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
 - 3) 오염을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 말 것

우 수 의 약 품
KGMP적격업체

Lynolin



비만증, 지질대사 개선제

리놀민

**연질
캡슐**

300캡슐

일 반 의 약 품
분류번호: 02180

경기도 화성시 향남읍 상선리 906-6

알앤피코리아(주)

최대용제약 계열사

【원료약품 및 분량】 1캡슐(560mg) 중

홍화유(USP) 333.33 mg
토코페롤이세테이트(KP) 6.67mg
파리독신염산염(KP) 0.67mg

【성 상】 미황색의 내용물이 든 일면 연녹색 일면 녹색의 타원형
연질캡슐

【효능 · 효과】

비만증, 당뇨병 본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선

【용법 · 용량】

1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분전에 복용

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

"어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오."

- 본의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에
의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어
야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 소비자 상담실: 02-568-0051
- 반품 및 교환처: 02-3661-9773



제조번호:

사용기한:



분리배출