

말초동맥순환장애 징코셀 정 (은행엽엑스)

【원료약품 및 분량】

1정(255 mg) 중 은행엽엑스(생규) 80mg

착색제(타르색소) : 황색 4호 알루미늄레이크, 청색 1호 알루미늄레이크 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 주요효능 효과

- 말초동맥순환장애(간헐성파행증)의 치료
- 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
- 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법 · 용량】

—성인 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회, 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구투여한다.

2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80밀리그램, 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 황색4호(타르트란)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

● 어지러움 ● 가려움증

4. 일반적 주의 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 임부에 대한 투여 동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

6. 소아에 대한 투여 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【포장단위】 30정, 600정 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【소비자상담실】 02-568-0051

【제조/외주】 (주)알파바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

【제조사】 (주)CMG제약 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성일자 : 2016. 09. 30

【제조/외주】



【제조사】



CMG제약