

천연물 생약의 혈액순환 개선제

징코멕스정 120mg

은행엽엑스

[원료약품 및 그 분량] 1정(295.6mg) 중

- 유효성분: 은행엽엑스(생규)(총 키크고플라본배당체로서 28.8mg) 120.0mg
- 첨가제(타르색소): 청색1호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 폴로이드성이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 프로필렌글리콜, 탈크, 산화티탄

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정**[효능 및 효과]**

1. 주 효능효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(시간 간격을 두고 되풀이하여 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

[용법 및 용량]

1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림)
은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다(먹는다).
- 2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다(먹는다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여(복용)하지 말 것. 1) 이 약에 과민증 환자 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 - 갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부 반응이 나타날 수 있다. 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상

사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당 성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

· 어지러움 · 가려움증

3. 일반적 주의 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여 동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월**[포장단위]** 100정(10정/PTP x 10), 200정(10정/PTP x 20)

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견 될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎031-692-2900) 또는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ PTP포장을 개봉하여 복용시 가급 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

[제조의뢰자]

 (주)레고켐제약
LegoChemPharma

경기도 안성시 원곡면 원당로 354

[제조사]

 Arlico
알리코제약(주)

충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

[판매자]

 GC녹십자

경기도 용인시 기흥구 미천로30번길 107

작성일 : 2018년 4월 16일
(Rev.0)