



임팩타민(Impactamin)이란?

임팩트(Impact) + 비타민(Vitamin)의 합성어로
건강에 실질적 효과를 드리는 기능성 비타민입니다.

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오. 사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

효능·효과

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력 저하 시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로
3. 아연의 보급


용법·용량 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1~2정 식후 복용하십시오.

지식인의 비타민 -임팩타민파워

지식사회인 현대에는 스트레스, 정신피로, 만성피로로 인하여 비타민B가
다량 소모되므로 최적의 건강과 질병예방을 위한 고품량 비타민B 복용 필요!

1. 빠른 피로회복을 위해 고단위 **비타민B10종, 아연, 비타민C** 함유
2. 활성형 **벤포티아민(Vit.B1)** 함유로 빠른 효과
3. 소형정제로 복용편리

- 육체 피로** : 스트레스, 업무 등으로 피로가 누적되어 쉽게 지치는 현대인
- 눈의 피로** : 컴퓨터 사용 등으로 피로를 느끼는 직장인, 수험생, 노인 등
- 구 내 염** : 입안내 염증을 호소하는 현대인



육체피로



눈의 피로



구내염

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

벤토타이민(비타민B ₁)(KPC)	50.0mg	시아노코발라민0.1%(시아노코발라민으로서	(아연으로서 15mg)
리보플라빈(비타민B ₂)(KP)	50.0mg	0.05mg)(KPC)(비타민B ₁₂)	50.00mg
니코틴아미드(비타민B ₃)(K)P	50.0mg	중추신경콜린(비타민B)(DAB)	50.0mg
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(K)P	50.0mg	아니시톨(비타민B)(KP)	50.0mg
피리독살염(비타민B ₆)(K)P	50.0mg	비오틴(비타민B)(USP)	0.050mg
폴산(비타민B ₉)(K)P	0.20mg	산화 아연(KP)	18.70mg

성 상 노랑색의 타원형 필름코팅정제



사용상의 주의사항

- 다음 환자분에게는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자분
 - 만1세 미만의 영아(갓난아기)
- 다음 환자분에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자분
 - 과수산노증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 형태)
 - 임부, 수유부
 - 심장·순환기계기능 장애 환자분
 - 신장장애(신장장애) 환자분
 - 저단백혈증 환자
 - 이 약은 황색5호(설테옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분에는 신중히 투여합니다.
- 부작용
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
구역, 구토, 묽은 변, 설사, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역질, 저혈압, 피부증, 구토
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 일반적주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여합니다.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 상호작용
 - 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용((함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
 - 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용((함께 복용(사용))투여하지 않습니다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라시클린계 제제, 제산제 나) 레보도파
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 임상검상치에의 영향
 - 각종 요검시시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검상치에 영향을 줄 수 있습니다.

저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 일정한(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저 장 방 법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오

포 장 단 위 자사포장단위

사 용 기 간 제조일로부터 36개월

※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변형·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.



제회 보건복지부장관
가족친화 우수기업



(주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일: 2009.03.20
최종 개정 연월일: 2012.06.11

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.