

콧물 · 코막힘 · 인후통

코뚜에프[®]시럽

【일반의약품】



COTTU[®]-F Syrup

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고,
첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】

100mL 중	
클로르페니라민말레산염(KP)	8.33mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	62.5mg
글리시리진산이칼륨(KP)	41.67mg
카페인무수물(KP)	31.25mg
첨가제(보존제) :	
파라옥시벤조산메틸(KP)	90mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	10mg
첨가제(타르색소): 적색 40호	

【성 상】 딸기향이 있는 담적색의 단맛이 있는 시럽제

【효능·효과】

급성 비염(코염), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비강염에 의한 다음의 증상 완화:
재채기, 콧물, 코막힘, 눈물, 목구멍의 통증, 머리 무거움

【용법·용량】

연령(나이)에 따라 1회 3~8mL씩 1일 4회, 식후복용

나 이	1 회량
3세 이상 - 7세 미만	8mL
2세 이상 - 3세 미만	6mL

1일 6회까지 복용가능, 4시간 이상의 간격을 두고 복용
만 2세 미만 : 의사의 진료를 받습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 알레르기증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 고혈압 환자
- 3) 심장병 환자
- 4) 신장장애(신장장애) 환자
- 5) 무중(부기) 환자
- 6) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨곤란 환자
- 7) 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자
- 8) 지병이 있는 환자, 허약체질 또는 고열 환자
- 9) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 10) 영아(갓난아기) 유아 및 고령자(노인)
- 11) 부종(부기)이 있는 환자
- 12) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 출혈성뇌졸중을 일으킬 수 있습니다.
- 2) 소화기계 : 구역, 구토, 구갈(목마름), 변비, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 기타 : 발진, 발적(출혈되어 붉어짐), 배뇨장애가 나타날 수 있습니다.
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는

치아지드계 이노제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담합니다.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 글리시리진산으로서 40mg이상인 제제는 장기 연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지합니다.
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지합니다.

4. 일반적주의

- 1) 이 약 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 4) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여합니다.
- 5) 장기간 계속하여 투여하지 않습니다.

5. 소아에 대한 투여

만 2세 미만의 영아는 의사의 진료를 받습니다.

6. 상호작용

다른 비염(코염)용 경구제(먹는약), 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담약(가래약), 진후제, 알레르기 용약 등)과 병용투여(함께 복용(사용))하지 않습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)에 보관합니다.

【사용기한】 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【포장단위】 100mL

【소비자상담】 080-203-6000(수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일 (2015년 8월 20일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지 (<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL:080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

최초 작성년월일 : 20031201

최종 개정년월일 : 20150820

 **코오롱제약**