

리게논-큐

 연질
캡슐

리게논-큐 연질캡슐은 간질환 치료제로 널리 사용되는 Milk thistle 열매의 추출물과 간장 보호에 필수비타민 수종이 복합처방된 간질환 치료 · 간장보조제로서 과로, 스트레스, 음주, 영양불량, 독성물질 등으로 인한 각종 간질환에 우수한 치료효과를 나타내고 간장의 손상으로 인한 만성 피로, 전신 권태감, 식욕부진, 소화불량 등의 증상을 개선시켜줍니다.

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

밀크시슬엑스(생규)	100mg
[실리마린	47.5mg
(실리빈으로서	24.94mg)]
티아민염산염(KP)	4mg
리보플라빈(KP)	4mg
피리독신염산염(KP)	4mg
니코틴산아미드(KP)	12mg
판토텐산칼슘(KP)	8mg
시아노코발라민(KP)	1.2μg
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 적색 40호, 황색 5호, 황색 203호	

【성 상】

노란색 유상물(기름상태물질)이 충전된 일면 갈색, 일면 황갈색의 연질캡슐제

【약 리 작 용】

- 간세포 보호 작용**
간세포막의 수용체에 결합하여 세포막을 안정화하여 유해물질의 간 세포내 침투 및 간세포 물질의 유출을 방지함으로써 간세포 보호 작용을 나타냅니다.
- 간세포 재생 촉진작용**
간세포의 RNA-polymerase I 의 작용을 활성화하여 rRNA의 합성을 증가시키고 ribosome의 양을 증가시킴으로써 단백질 합성이 증가되고 손상된 간세포의 재생이 촉진됩니다.
- 항산화 작용**
강력한 ROS 제거 작용으로 유리기를 제거하고, 생체내 항산화물질인 글루타티온의 농도를 증가시켜 과산화로 인한 세포괴사를 막아줍니다.
- 항염증 작용**
염증 반응에 중요한 역할을 하는 leukotriene의 생성과정을 강력하게 억제하여 간세포의 염증을 완화시켜줍니다.
- 항 섬유화 작용**
콜라겐의 축적을 억제하여 섬유조직 증식으로 인한 간 손상을 예방합니다.

· Reference

- Saller R, Meier R, Brignoli R. The use of silymarin in the treatment of liver diseases. Drugs. 2001;61(14):2035-63.
- Dehmlow C, Murawski N, de Goot H. Scavenging of reactive oxygen species and inhibition of arachidonic acid metabolism by silybin in human cells. Life Sci. 1996;58(18):1591-600.
- Dehmlow C, Erhard J, de Goot H. Inhibition of Kupffer cell functions as an explanation for the hepatoprotective properties of silibinin. Hepatology. 1996 Apr;23(4):749-54.

【효능 · 효과】 다음 질환의 보조치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

[용법 · 용량]

성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용하십시오. 치료후 복용량을 1일 1~2캡슐로 줄이십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하여야 합니다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않습니다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 설사
 - 2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
 - 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오.
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 2년

[포장단위] 자사포장단위(외부용기에 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의뢰자

코스닥상장



신일제약(주)

충청북도 충주시 양성면 복성골길 28

제조사 : (주)서흥

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61



설명서 개정년월일 : 2014.09.01