

【원료약품의 분량】 1매(10cm×14cm, 12g)중

살리실산글리콜 (식품의약품청고시)	240mg
엘-멘톨 (약전)	80mg
디엘-캄파 (약전)	80mg
토코페롤아세테이트 (약전)	48mg
디펜히드라민염산염 (약전)	16mg
에녹솔론(EP)	8mg
첨가제(보존제):파라옥시벤조산메틸 (약전)	12mg
첨가제(보존제):파라옥시벤조산프로필 (약전)	6mg

【성 상】

백색의 점착성의 고체를 부직포상에 도포한 방향을 가진 카타플라스마제입니다.

【효능·효과】

다음질환 및 증상의 진통·소염:염좌, 타박, 근육통, 관절통, 골절통, 요통, 견통

【용법·용량】

1일 1~2회 환부에 부착하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.
30개월 이하의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 사용하십시오.
소아에 적용시 경련을 유발할 수 있으므로 신중히 사용하십시오.
3. 다음 부위에는 사용하지 마십시오.
1) 눈주위, 접막 등
2) 습윤, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위
4. 다음 사람은 사용전에 약사 또는 의사와 상의하십시오.
1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상 (발진, 발적, 가려움증, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람

- 2) 습윤이나 진무름이 심한 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
5. 사용할 때 다음에 주의하십시오.
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하십시오.
3) 이 약은 외용오로만 사용하고 복용하지 마십시오.
6. 사용 중 또는 사용후에는 다음에 주의하십시오.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
2) 수일간 사용하여도 증상이 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
7. 보존 및 취급상의 주의
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 서늘한 곳에 밀전하여 보존하십시오.
3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 【포장단위】 5매

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우 구입하신 병·의원 또는 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※상기표시 사항 중 작성일자(2008년 12월 3일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



주식회사 녹십자

충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50 TEL. 031)260-9300
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033



분리배출

호일-20-4011-3