

[사용상의주의사항]

1. 경고
 - ① 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
2. 다른 사람과 복용하지 마십시오
 - 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상 (예: 발진, 발적, 가려움, 부종<후두, 눈꺼풀, 입술 등>)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 2) 지금까지 이 약 또는 다른 진통제, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
3. 다른 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상 (예: 발열, 발진, 관절염, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 염류아 및 14세 이하의 어린이
 - 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
 - 5) 심장병 증세가 있는 사람, 또는 고령자
 - 6) 복내장 (예: 뇌의 동맥, 뇌의 정맥혈관 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오
 - 1) 음방 • 음량을 지켜 주십시오
 - 2) 물을 마실 때는 동시에 복용하지 마십시오
 - 3) 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
 - 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 영아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
 - 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되고 있으므로 이 약 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오

- ① 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수축이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
- ② 고열을 수반하여 발진, 발적, 화상모양 수포등의 격렬한 증상이 정신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
- ③ 천식이 나타난 경우
6. 버러탈개약물, 심한 경우 울혈 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장농도를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜과 과잉투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오
 - 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오
 - 2) 복용하는 동안 물음에 오는 경우기 있으므로 자동차 및 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오
 - 3) 수화 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오
 - 4) 장기 연용하지 마십시오
 - 6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하여 주십시오
 - 2) 각 지일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하여 주십시오
 - 3) 모드를 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오
 - ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오
 - ※ 구입시 사용기간과 경과여부나 변질 • 변색 • 오염되거나 손상된 약약품종 구입처를 통하여 교환하여 드립니다
 - ※ 개정연월 이후 변경된 내용은 031-495-3399 이나 www.stexpharm.com에서 확인할 수 있습니다.
 - 개정연월 2007년 8월

제조사 **주)익스프레스**

주요제 **리드팜(주)**

제조번호 7007
유통기한 2010. 08. 12



[성분 • 함량] 1정 중
아세트아미노펜(약정) 600mg
염산수소도페드린(비피) 30mg
말레인산클로르페니라민(약정) 2mg
[성상]
백색의 장방형 들록코팅정제

[효능 • 효과]
감기의 증상(코막힘, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
[용법 • 용량] 성인 및 12세이상 어린이:
6시간마다 2정씩, 1일 최대 8정을 초과하지 마십시오
[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

KGMP
적격업체제품
일반의약품

10정

효과빠른 콧물감기약
● 콧물 ● 코막힘 ● 재채기 ● 인후통
익스프레스

Leadpharm

주)리드팜(주)

익스프레스