

끈적임 없고 흡수가 빠름—
로나실덤겔
(테르비나핀)

일반의약품
분류번호 265

K.G.M.P

우수의약품지정업체

【원료약품의 분량】 1g 중

테르비나핀(별규) 10mg

첨가제(보존제): 벤질알코올(KP) 2mg

【성 상】 흰색 또는 회백색의 겔제

【효능·효과】

1. Trichophyton(즉, T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이) 감염증 : 족부백선(발백선증, 무좀), 고부백선(대퇴부백선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare(Malassezia furfur)에 의한 전풍(어루러기)

【용법·용량】

사용방법 : 이 약은 1일 1회 적용한다. 적용 전에 감염부위를 깨끗하게 씻고 말린 후 감염부위 및 그 주위에 얇게 바른다. 간찰성 감염(유방 밑, 손, 발가락 사이, 둔부(엉덩이) 사이, 서혜부)의 경우, 야간에는 거머즈를 덮어 사용할 수도 있다.
치료기간 : 1일 1회 1주 증상의 경감은 통상 2~3일 이내에 나타난다. 불규칙한 사용 또는 조기 투약 중지 시 재발의 위험성이 있다. 1주일 투약 후에도 증상이 개선 징후가 없다면 진단을 확인해 보아야 한다.

※ 특장점

1. 로나실덤겔은 테르비나핀 베이스로 된 흰색 또는 회백색의 겔제입니다.
2. 로나실덤겔은 특유의 시원함과 함께 흡수가 빨라 백선의 가려움과 작열감(화끈감)을 빠르게 없애줍니다.
3. 로나실덤겔은 끈적임이 없고 이물이 남지 않는 특징이 있어 털이 많거나 넓은 부위에 바르기 좋습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것.
테르비나핀 및 이 약 성분에 대해 과민증의 전력이 있는 환자
2. 부작용
1) 피부 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감이 적용부위에 나타날 수 있다.

3. 임부, 수유부에 대한 사용

- 1) 동물에 대한 생식독성시험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임부에 투여하는 경우에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)하는 경우에만 투여할 것.
- 2) 이 약은 모유 중에 분비되므로, 이 약을 투여 중인 수유부는 수유를 중지할 것.

4. 어린이에 대한 투여

어린이에 대한 사용경험이 제한적이므로 투여하지 말 것.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용할 것.
- 2) 눈 주위에는 사용하지 말 것.

【포장단위】 15g

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 30℃이하 저장, 제조일로부터 36개월

【제조자】 콜마파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

【제조회자 및 판매】 (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

※ 본 의약품은 우수의약품관리기준(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다. 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참고하시기 바랍니다.

※ 내가 신고한 작은 부작용 국민건강 초석된다.
(온라인의약도서관 : 1577-1255, drug.mfds.go.kr)

※ 이 첨부문서의 개정년월일 이후로 변경된 허가사항은 당사 홈페이지(www.bi-nex.com)나 전화(080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

<http://www.bi-nex.com>

☎080-263-3151

개정년월일 : 2015년 01월 20일



주)바이넥스
부산광역시 사하구 다대로 368-3