



활성형 종합비타민제 바로코민® 정 Varocomin Tablet

일반의약품
316 : 혼합비타민제 (비타민 A, D 혼합제를 제외)

바로코민®정은 활성비타민인 푸르설티아민(T.T.F.D : Thiamine Tetrahydro furfuryl disulfide)을 비롯하여 비타민 B₂, B₆, B₁₂, C, E가 합리적으로 처방된 제제로서 활성비타민은 흡수가 우수하고 보효소로서의 전환율이 높아서 생체내 이용율이 뛰어납니다.

【성분·함량】 1정중

푸르설티아민(KPC)	50mg
리보플라빈(KP)	2mg
페리독신염산염(KP)	2mg
0.1% 시아노코발라민(KPC)	5mg
(시아노코발라민으로서 5μg)	
아스코르빈산 97% 과립(별규)	61.86mg
(아스코르빈산으로서 60mg)	
초산토코페롤 50% 과립(별규)	100mg
(초산토코페롤로서 50mg)	

【성상】 적색의 타원형 필름코팅정

【약리작용 및 특징】

1. 만성피로
신경과 근육에 쌓인 피로물질을 신속히 분해, 배설시킬뿐 아니라 신진대사를 원활하게 하여 피로를 없애줍니다. 또한 눈의 신경과 모양체근에 작용하여 눈의 긴장과 피로를 풀어줍니다.
2. 신경통, 견통, 요통
푸르설티아민은 신경과 근육에 영양을 공급하여 신경·근육대사를 촉진하고 상한 신경세포를 재생시킴으로써, 신경통, 견통, 요통에 치료효과를 발휘합니다.
3. 병중·병후, 소모성질환
비타민B군 및 비타민C, E가 상승적으로 작용하여 인체의 면역기능을 강화하며, 음주나 흡연, 병중·병후, 소모성질환 등에 의해 결핍되기 쉬운 비타민을 효과적으로 공급합니다.

【효능·효과】 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음증상의 완화 : 어깨·목걸림, 수족저림, 수족냉증
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등)
- 각기, 눈의 피로

【용법·용량】 성인 1회 1정, 1일 1~2회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 않아야 합니다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 설사, 묽은변 및 구내염 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 알레르기 반응을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 페리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.

 - 레보도파
6. 임상검사치에의 영향
 - 1) 각종 요검사에서 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 어선광선을 피하고 밀 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 100, 500정

- * 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) →「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하십시오.
- * 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사, 약사와 상담 후 사용하십시오.
- * 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- * 본 제품은 소비자피해보상규정(제정경제부고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대하여 보상해 드립니다.
- * 본시는 고객 상담 전용 수신자부담 전화(080-200-0101)를 운영하고 있습니다.
- * 의사, 약사는 의약품 등의 투여 사용 중 유행사례나 약물유해반응이라고 판단되는 경우 이를 의약품 안전성 정보 보고 절차에 따라 전화, 팩스, 전자문서 또는 인터넷을 통해 식약청장, 관련 협조단체장, 또는 제조업자에게 보고하여 주시기 바랍니다.
- * 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 최신의 의약품안전성 정보는 신풍제약(주) 홈페이지(www.shinpoong.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

3-0290(S)
설명서 작성년월일19920210
개정년월일 20091103