

규격	114x220
종이	70모조
접지	114x55
삼진기획	

일반의약품
조 제 용

위장운동조절 및 진경제

레큐틴정

(트리메부틴말레산염)

HT-250225

Recutin Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) 100mg
기타첨가제 : 옥수수전분, D-만니톨, 분말셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 크로스카멜로오스 나트륨, 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 정제수

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】

1. 주요능 효과
- 1) 식도역류 및 열공(틈새)헤르니아(탈장), 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상 (복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
 - 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
 - 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자) 통과장애(변비, 설사)

【용법 · 용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다(복용한다).
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 부작용
- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
 - 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
 - 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
3. 임부에 대한 투여
- 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
4. 수유부에 대한 투여
- 수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지한다.
- 【포장단위】 30정/병, 500정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 제조일로부터 36개월

- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7900)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutecs.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(☎1644-6223, ☎14-3330)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

우수약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 : 880701
설명서 개정일 : 250225