

미소순환개선제

펜톡신서방정400mg

(펜톡신필린)

Pentoxin Tab.

펜톡신서방정400mg은 미소혈관 및 말초혈관 순환장애에 있어서 무리하게 혈관을 확장시켜 인위적으로 순환을 개선시키는 혈관확장제의 개선제는 달리 원칙적으로 혈액의 유동성을 증가시킴으로써 병적상태에서 통과하기 힘든 좁은 혈관에서도 원활하게 혈류를 유지시키는 약리작용을 가지고 있습니다.

펜톡신서방정400mg은 특히 미소혈관이 침종되어 있는 뇌혈관계의 순환장애로 기인되는 뇌의 허혈, 뇌졸중의 결핵, 뇌졸중후증상 등을 현저히 개선시킬 뿐 아니라 기타 미소혈관의 장애로 인한 시력감퇴, 청각감퇴, 말초순환장애에도 치료효과가 우수합니다.

【약리작용 및 특징】

1. 혈액 중의 순상된 적혈구는 순환이 진행되는 동안 미소혈관에 도달했을 때 통과가 용이하도록 변형되는 변형 능력을 지니고 있습니다.
2. 혈액 중 혈소판의 응집성이 증가되면 특히 미소혈관에서 원활한 순환을 기대하기 어렵습니다.
3. 펜톡신서방정400mg은 혈소판의 응집을 억제하여 혈류를 정상화시켜 줍니다.
4. 펜톡신서방정400mg은 상승된 혈액의 점도를 저하시킴으로써 병성된 혈액의 유동성을 개선시킵니다.
5. 펜톡신서방정400mg은 위와 같이 혈류가 순상된 부위의 미소순환(Microcirculation)을 증가시키므로 뇌혈관계에 현저히 개선시킬 뿐만 아니라 안순환장애, 내이불균형 및 말초순환장애에도 우수한 치료효과를 나타냅니다.
6. 펜톡신서방정400mg은 위에서 상세히 언급한 점에 의해, 출혈성도도 체계화하였으므로 위에 부담 없이 약효의 활성을 기대할 수 있습니다.

【활약약품의 분류】 1정 중

펜톡신필린(K₉) 400mg

【성 상】 흰색의 장방형 필름코팅 정제

【효능·효과】

1. 뇌순환장애(허혈 및 뇌졸중후증상, 어지러움·두통·건망증 등 뇌동맥경화증 증상)
2. 눈의 혈류순환장애
3. 말초동맥순환장애(간헐성파행, 휴식시 통증, 당뇨병성혈관병증, 위축증, 혈관신경병증)

【용법·용량】

성인 : 펜톡신필린으로서 1회 400mg 1일 2~3회 식후에 소량의 음료와 함께 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 또는 다른 혈관확장제 약물에 과민증의 병력이 있는 환자.
 - 2) 급성 심근경색 환자
 - 3) 대동맥 협착성 혈관질환의 위험이 있는 환자
 - 4) 광범위한 망막 출혈 환자(출혈증)의 위험이 있는 환자
 - 5) 케토혈당을 투여받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 중증의 심부전증 환자
 - 2) 저혈압, 관동맥질환 환자
 - 3) 신기능 장애 환자(크레아티닌 클리어런스가 30ml/min 이하)
 - 4) 중증의 간기능 장애 환자
 - 5) 항응고제 치료 또는 응고 장애 등에 의해 출혈경향이 증가된 환자
3. 이상반응
 - 1) 과민증 : 때때로 소양감, 피부 붉어짐, 두드러기 등이 그리고 개인에 따라 혈관신경성 부종, 기관지 경련, 심저에 소크와 같은 중증의 이상반응(아나필락시도 반응)이 나타날 수 있다. 아나필락시(아나필락시도 반응)이 나타나면 이 약의 투여를 즉시 중단하고 의사에게 알려야 한다.
 - 2) 소화기장애 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 위부 불편감, 설사, 복부 팽만감, 구갈, 담낭증, 드물게 가쓰스키, 변비, 복통 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 순환장애 : 때때로 호흡곤란, 부종, 드물게 협심증, 혈관경화 등이 나타날 수 있다. 또한 빈맥이 보고되었다.
 - 4) 간장애 : 드물게 ALT, AST 상승이, 개인에 따라 간장애 담즙효소, transaminase 상승이 나타날 수 있다.

- 5) 혈액 : 특히 출혈 경향이 증가한 환자에서는 드물게 출혈(피부 및 점막, 위장관계에서)이 나타날 수 있으며, 개인에 따라서는 혈소판감소가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 6) 정신신경계 : 드물게 발한, 두통, 어지러움, 불면, 시력 불신경 등의 시각장애, 불안, 보행이상, 구토, 구토, 구토, 구토 등이 나타날 수 있다.
- 7) 호흡기 : 드물게 비출혈, 독감증상, 비출혈, 후두염 등이 나타날 수 있다.
- 8) 기타 : 드물게 요배, 감각이상, 입창, 이통, 권태감, BUN상승, 손목 부러짐, 고비, 타액과다, 백혈구감소, 무균성수막염 등이 나타날 수 있다.
- 9) 특히 펜톡신필린을 고용량 투여했을 때, 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있다. , 발열, 위압과 같은 위장관 불쾌감, 편두통, 구역, 구토, 설사 등이 빈번하게 일어나 때때로 부정맥에 : 빈맥이 일어날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 뇌동맥경화증에 사용할 때에는 간헐적으로 증후를 하여 진단이 확립된 환자에만 투여한다. 다음 항목을 만족하고 동시에 뇌의 구조증상을 나타내지 않는 뇌동맥경화증에 기인하는 뇌순환 장애에 의한다고 판단되는 정신증상 등을 가진 환자에만 투여한다.
 - 1) 연령 : 40이상
 - 2) 증상 : 두통, 어지러움, 기억력감퇴, 수족의 마비감, 언어장애, 근긴장 감소, 보행장애 등.
 - 3) 혈압 : 최대혈압 160mmHg 이상 또는 최소혈압 90mmHg 이상의 어느 쪽을 항상 유지
 - 4) 인지능력 : KW, II 도 이상
 - 2) 고혈압치료는 받고 있는 환자에 이 약을 투여할 경우에는 정기적 전신 혈압모니터를 실시하는 것이 바람직하다.
5. 상호작용
 - 1) 항응고제 또는 혈소판응집억제제와 병용투여 또는 단독투여시 출혈, 프로트롬빈시간의 연장이 보고되었다.
 - 2) 안술전 또는 경구용 혈당강하제의 혈당강하작용을 증강시킬 수 있으므로 당뇨병 치료제를 투여받고 있는 환자의 경우 주의깊게 모니터링한다.
 - 3) 이 약은 고혈압 약을 낮 혈압을 낮추는 다른 약물들과 혈당강하작용을 증가시킬 수 있다.
 - 4) 펜톡신필린과 테오필린을 병용투여할 경우 몇몇 환자에서 테오필린의 혈중농도가 증가할 수 있으며 따라서 테오필린에 의한 이상반응이 증가하거나 심해질 수 있다.
 - 5) 펜톡신필린은 케토콜라과 병용투여시 출혈 및 프로트롬빈 시간 연장의 위험이 있으므로 병용투여하지 않는다.
6. 임부 및 수유자에 대한 주의
 - 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 모유수유로 이행이 보고되어 있으므로 수유중인 부인에는 투여를 피한다.
7. 소아에 대한 주의
 - 1) 소아에 대한 사용경험은 없다.
8. 고령자에 대한 주의
 - 1) 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
9. 과량투여시의 처치
 - 1) 특별한 해독제는 알려져 있지 않으며 과량을 투여한 경우에는 인공적으로 제거 할(오세)에 : 위세척) 유요성분이 더 이 선 전신으로 흡수되지 않도록 먹거나 그 흡수를 지연시킨다. (예 : 활성탄)
10. 기타
 - 1) 투여에 고용량 투여시 양성 유방선성종양이 나타났다는 보고가 있다.
11. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고요인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의해야한다.

【포장단위】 자포장단위

【처방방법 및 사용기간】 기용용기, 실온(1~30℃)보관. 제조일로부터 36개월

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변형, 파손 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품이 더하여 저하한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7900)로 문의하시기 바랍니다.
※ 이 첨부서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국후텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr)에서 확인해주시십시오.



한국 후텍스제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제양공단3길 99



설립자 창설일 020827
설립자 개정일 130902