

이시원

사라지는 뱀살

일반의약품
KGMP역적업체

26

8 806581 011419

【원료약품 및 그 분량】 1정 (755mg) 중

■ 유효성분 : 방풍통성산연조엑스(5.2~1)(발균).....1.0g

당귀(KP)	0.20g
작약(KP)	0.20g
천궁(KP)	0.20g
연교(KP)	0.20g
박하(KP)	0.20g
방풍(KP)	0.20g
마황(KP)	0.20g
대황(KP)	0.25g
망초(생규)	0.25g
길경(KP)	0.34g
황금(KP)	0.34g
석고(생규)	0.50g
생강(생규)	0.20g
치자(KP)	0.20g
형개(KP)	0.20g
백출(KP)	0.34g
감초(KP)	0.34g
활석(생규)	0.84g

■ 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아린산마그네슘, 오파드라이 빨간색(200F6 50003), 크로스카멜로오스나트륨, 폴리메틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】 배에 피하지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상 (두근거림, 어지러움, 홍조, 비만, 부기, 변비)

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축 작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.)
 - 수유유(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사약
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 부종(부기) 환자
 - 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람(줄임)하는 등 주의할 것)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 - 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
 - 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
 - 배뇨장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 감상기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자

15) 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상임시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것)
 - 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것
 - 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - 피부 : 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나는 경우
 - 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
 - 비뇨기계 : 배뇨장애
 - 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것
- 1개월(변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것.
- 다른 한약제제 등과 병용 투여할 경우 함유 성상의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용(함께 복용)투여 시 특히 주의할 것.
- 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감작성제제(티록신, 리오치오닌), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 코산틴계제제(테오필린, 디프로필린)와 병용 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감람(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
- 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(프레클로메타이드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것(양해과립(제알약) 품에 한함).

6. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 케이스 열면 표시일까지

【포장단위】 30정/병, 180정/병, 360정(180정/병 x2), 300정/병

【분류번호】 [219] 기타의 순환계용약

- * 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 의약품용 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 본 첨부문서 작성일자(2018년 2월)이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

* 제품 개봉시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입울 수 있으니 주의하십시오.

제 조
판매처 **한중제약**
전북 완주군 봉동읍 완주
신단로 301, 봉동로 705

www.hanpoong.co.kr
소비자상담실: 02-521-2618