



디기탈리스 강심제

〈전문의약품〉

분류번호 : 211

디고신정

(디곡신)

원료약품 및 그 분량

이 약 1정(120mg) 중 디곡신(KP)0.25mg을 함유
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

성상

흰색의 원형정제입니다.

효능 · 효과

1. 율혈성심부전(폐부종, 심장천식 등 포함) : 관막질환, 고혈압, 허혈성심질환(심근경색, 협심증 등), 선천성심질환, 폐성심(폐혈전, 색전증, 폐기종, 폐섬유증)에 의한 것.
2. 심방세동 · 조동에 의한 빈맥, 발작성심방성빈맥
3. 기타 심질환(심막염, 심근질환 등), 갑상선기능항진증 및 저하증
4. 심부전 또는 각종 빈맥의 예방 및 치료

용법 · 용량

1. 성인
 - 1) 급속 포화요법(포화량 : 1.0~4.0mg) : 디곡신으로서 초회 0.5~1.0mg, 이후 0.5mg을 6~8 시간마다 경구투여하고 충분한 효과가 나타날 때까지 계속합니다.
 - 2) 완서 포화요법을 사용할 수도 있습니다.
 - 3) 유지요법 : 1일 0.25~0.5mg을 경구투여합니다.
2. 소아
 - 1) 급속 포화요법
 - 2세 미만 : 1일 체중 kg당 0.06~0.08mg을 3~4회 분할 투여합니다.
 - 2세 이상 : 1일 체중 kg당 0.04~0.06mg을 3~4회 분할 투여합니다.
 - 2) 유지요법
 - 포화량의 1/5~1/3을 투여합니다.
 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 방실블록(특히 애덤스-스토크스증후군), 동방블록, 경동맥동증후군 환자
 - 2) 디기탈리스 중독, 폐쇄성 심근병증(특발성 비대성 대동맥관협착증 등) 환자
 - 3) 심실빈맥 환자
 - 4) WPW증후군 환자
 - 5) 이 약에 과민증 환자
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 다음 환자에게는 신중히 투여 하십시오.
 - 1) 급성 심근경색, 심실성 기외수축, 심내막염, 폐성심, 갑상선기능항진 또는 저하증, 신장에 환자(저용량에서도 중독을 일으키기 쉽고 효과의 발현이 현저하지 않으므로 과량 투여로 중독을 일으킬 위험이 있습니다.)
 - 2) 혈액투석을 받고 있는 환자
 - 3) 전해질평형실조(저칼륨혈증, 고칼륨혈증, 저마그네슘혈증) 환자
 - 4) 동기능부전증후군 환자(동서맥을 유발 또는 악화시키거나 동방블록을 일으킬 수 있습니다.)
 - 5) 중증의 호흡기질환 환자(디기탈리스제제에 대한 심근의 감수성을 증가시킬 수 있습니다.)
3. 부작용
 - 1) 다음과 같은 중독증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 감량하거나 휴약하고 다시 저용량에서 재투여를 시작하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - ① 소화기계 : 식욕부진, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 순환기계 : 부정맥(심실성 기외수축), 방실블록, 빈맥, 현저한 서맥 등이 나타날 수 있습니다.
 - ③ 눈 : 시각장애(빛이 없는 곳에서 가물가물하게 보임, 황시, 녹시, 복시, 등)가 나타날 수 습니다.
 - ④ 정신신경계 : 어지러움, 두통, 방향감각상실, 착란, 허약, 감정둔화, 피로, 권태, 우울 등이 나타날 수 있습니다.

- 2) 과민증 : 발진, 두드러기, 자반, 부종, 호산구증가, 혈소판감소, 홍반성 루푸스(LE)양 증후군 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 3) 기타 : 드물게 여성형 유방, 근력저하 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약을 투여할 경우에는 관찰을 충분히 하고 과거 이 약 투여 2~3주 이내에 디기탈리스 제제 또는 기타의 강심배당체가 투여되었는지를 확인한 후 신중히 투여량을 결정합니다.
 - 2) 흡수불량증후군 또는 위장관이 복구된 환자는 더 많은 용량이 필요합니다.
 5. 상호작용
 - 1) 다음 약물과 병용투여시 디기탈리스 중독을 일으키기 쉬우므로 병용투여할 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여합니다. : 칼륨배설성 이뇨제(치아짓게 이뇨제, 에타크린산, 클로르탈리돈, 푸로세미드 등), 아미오다론, 스피로노락톤, 칼슘제, 레세르핀계 약물, 아트로핀계 약물, β -차단제, 교감신경효능약, 갑상선제제, 퀴닌, 칼슘길항제, 이트라코나졸, 인도메타신, 프로파페논, 캅토프릴, 플레카이니드, 프라조신, 프로판테롤, 테트라사이클린, 에리스로마이신, 리튬염, 코르티코스테로이드, 카르베록솔론
 - 2) 다음 약과 병용투여시 이 약의 흡수를 지연 또는 감소시킬 수 있으므로 이 약의 흡수 저해를 피하기 위하여 가능한 투여간격을 늘이는 등 신중히 투여합니다. : 콜레스티라민, 황산프라디오마이신, 제산제, 카올린-펙틴, 철파살라진, 네오마이신, 메토클로프라마이드, 디페녹실레이트, 리팜피신, 페니토인, 페니실라민
 6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유중인 부인에 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.
 7. 소아에 대한 투여
소아에 투여할 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여량을 결정합니다.
 8. 고령자에 대한 투여
고령자에 투여할 경우에는 부작용이 나타나기 쉬우므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여량을 결정합니다.

저장방법

차광기밀용기, 실온보존(1~30℃)

포장단위

1000정

- 이 첨부문서 작성일자(2014년 04월 02일)이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) ➡ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) ➡ (의약품 유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관 하세요.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마세요.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

제조사

씨제이헬스케어주식회사

충북 청원군 오송읍 오송생명2로 239

고객행복센터:080-700-8802

<http://www.cjp.co.kr>

FD-630517

LD-140402

55

631194102