



630863I04

분류번호: 211
〈일반의약품〉



데카키논[®] 캡슐

(유비데카레논)

Decaquinon[®]

CAPSULE


원료약품 및 그 분량

1캡슐(190밀리그램) 중 유비데카레논 5.0mg(JP) 함유.
타르색소(캡슐기재): 적색40호, 황색4호, 황색5호
일반명: Ubidecarenone
(별명: Coenzyme Q10, Ubiquinone 10)

화학명: 2-3-Dimethoxy-5-methyl-6-decaprenyl-benzoquinone

분자식: C₅₉H₉₀O₄

분자량: 863.34



성상

상반은 등색이고 하반은 미갈색의 경질캡슐제로서 그 내용물은 황색의 미과립제로 맛과 냄새는 없습니다.

효능·효과

울혈성심부전 (경증(가벼운 증상)-중등도)

용법·용량

성인: 유비데카레논으로서 1회 10mg(2캡슐) 1일 3회 식후에 경구 투여합니다.(먹는다, 복용한다)
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

- 부작용
 - 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 식욕부진, 구토, 설사가 나타날 수 있습니다.
 - 피부: 때때로 발진이 나타날 수 있습니다.
 - 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림), 열감이 나타날 수 있습니다.
 - 기타: 수족냉증이 나타날 수 있습니다.
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 투여합니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

저장방법

차광, 기밀용기, 실온보존 (1~30℃)

포장단위

100, 500캡슐.

- 이 첨부문서 작성일자(2014년 03월 25일)이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원 (<http://www.drugsafe.or.kr>) (의약품 유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관 하세요.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

FD-761115
LD-140325

원료·기술제휴원
 Eisai Co., Ltd.
Human Health Care Company
Koshikawa 4-6-10, Bunkyo-ku,
112-8068 TOKYO, JAPAN.
Tel: 03-3817-3924 Fax: 03-3811-0977

제조사
씨제이헬스케어주식회사
충북 청원군 오송읍 오송생명2로 239
고객행복센터: 080-700-8802
<http://www.cjp.co.kr>

® = 등록상표 47
630863I04

82mm