

※의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의 깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

분류번호:313

일반의약품



손발저림, 신경통에

씨제이 **비타민E** 캡슐

CJ VITAMEDIN

본제¹⁾는 일본 다이이찌산교사가 독자적으로 개발한 비타민B₁₂의 활성형 유도체인 베포티아민에 피리독신염산염(비타민B₆)과 시아노코발라민(비타민B₁₂)을 배합, 제제화함으로써 비타민 B₁, B₆, B₁₂의 대사장애로부터 기인된 각종질환의 원인적 치료효과를 기대할 수 있는 치료목적의 복합비타민제제입니다.

본제²⁾가 함유하고 있는 성분은 모두 신경대사에 깊이 관여하고 있는데, 특히 특이한 화학구조를 가진 베포티아민은 비타민B₁₂ 염산염과 비교시 체내 활성형으로의 전환율이 높을 뿐만 아니라 각 장기에 고농도로 이행됨이 입증되었습니다. (*주요문헌 1~6)

원료약품의 분량

본제³⁾는 1캡슐(240.0mg) 중 다음의 성분을 함유합니다.

베포티아민(KPC)(티아민염산염으로서 25.0mg)	34.58mg
피리독신염산염(KP)	25.0mg
시아노코발라민(KP)	0.25mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

성상

분홍색의 분말이 든 상반은 적색, 하반은 연한 노란 분홍색의 경질캡슐제입니다.

작용·특징

신경기능의 원화 :

비타민 B₁, B₆, B₁₂는 모두 신경의 대사와 밀접한 관련이 있는데 만약 결핍시에는 신경세포, 신경섬유, 축삭 등의 신경조직에 병변을 일으켜 지각 및 운동기능에 장애를 초래하게 됩니다. 실제로 토끼의 좌골신경⁴⁾ 및 고양이⁵⁾의 경골³⁾신경을 절단하고 그 양끝을 외과적으로 봉합⁴⁾한 후 신경재생 및 지각·운동기능 회복을 검토한 동물실험을 시행한 바, 본제¹⁾의 함유성분인 비타민 B₁, B₆, B₁₂가 상호 상승적으로 작용한다는 것이 입증되었습니다. (*주요문헌 7~9)

효능·효과

● 다음 증상의 완화

신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통⁶⁾등), 수족⁶⁾저림, 눈의 피로

● 다음 경우의 비타민 B₁, B₆, B₁₂ 보급

육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하 시

<허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.>

용법·용량

성인 1회 2캡슐, 1일 1~2회 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음의 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시키십시오.

4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 드물게 발진, 가려움증 등의 과민증이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 이 약에 함유되어 있는 비타민B₆가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있습니다.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여⁷⁾ 보관하십시오.
- 3) 오용⁸⁾을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

<용어해설>

- 1) 본제 : 이 약
- 2) 좌골신경 : 궁둥이 빠신경
- 3) 경골 : 정강뼈
- 4) 봉합 : 꿰뚫
- 5) 건통 : 어깨결림
- 6) 수족 : 손발
- 7) 밀전하여 : 뚜껑을 꼭 닫아
- 8) 오용 : 잘못 사용

저장방법

기밀봉기, 실온보존(1~30℃)

포장단위

500캡슐

- 이 첨부서 작성일자(2014년 04월 03일)이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) ➡ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) ➡ (의약품 유통사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하세요.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관 하세요.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마세요.

< 주요문헌 >

1. 祖父江逸郎外 : 最新醫學 14, 2954(1959)
2. 阿部達夫外 : 綜合臨牀 18, 2609(1969)
3. 和田忠南外 : VITAMIN 22, 342(1961)
4. 砂川玄俊外 : VITAMIN 33, 210(1966)
5. 砂川玄俊外 : VITAMIN 34, 444(1966)
6. Shindo, H. et al. : Chem.Pharm.Bull. 15, 295(1967)
7. 長川和雄外 : 日本藥理學雜誌 69, 483(1973)
8. 長川和雄外 : 日本藥理學雜誌 74, 721(1978)
9. 岩田宣芳外 : 日本藥理學雜誌 75, 9(1979)

원로·기술제휴사

DAIICHI SANKYO CO., LTD.
TOKYO, JAPAN

제조사

씨제이헬스케어주식회사

충북 청원군 오송읍 오송생명2로 239
고객행복센터:080-700-8802
<http://www.cjp.co.kr>

FD-850716

LD-140403

☎=등록상표