

위염·위궤양 치료제

셀벡스[®] 캡슐

(테프레논)

SELBEX[®] (Teprenone)

전문의약품

약효분류 : 232 소화성 궤양용제

010218

원료약품 및 그 분량

1캡슐 중

유효성분 : 테프레논(JP) 50mg

• 일반명 : 테프레논 (Teprenone)

• 화학명 : 3:2 (5E:5Z) geometrical mixture of (9E,13E)-6,10,14,18-tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one

• 분자식 : C₂₃H₃₈O

• 분자량 : 330.55

• 굴절율 : n_D^{20} : 1.485~1.491

• 비중 d₄²⁰ : 0.882~0.890

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 젖) / 첨가제(타르색소) : 황색1호, 황색5호
기타 첨가제 : 옥수수전분, 캡슐, 탭크, 토포페롤, 폴리에틸렌글리콜6000, 함수이산화규소

성상

이 약은 흰색~미황백색의 과립 및 분말이 든 상부 회청록색, 하부 담등색의 불투명한 경질캡슐제이다.

효능·효과

- 위궤양
- 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

용법·용량

성인 : 테프레논으로서 1일 150mg을 3회 분할 식후에 경구투여한다. 연령·증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음의 환자에는 투여하지 말 것
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
(1) 소화기계 : 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구갈, 구역, 복통 등의 증상이 나타날 수 있다.
(2) 간장 : 때때로 GOT, GPT 치의 가벼운 상승이 나타날 수 있다.
(3) 정신신경계 : 드물게 두통 등의 증상이 나타날 수 있다.
(4) 피부 : 드물게 발진, 전신가려움증 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
(5) 기타 : 드물게 총 콜레스테롤치의 상승, 안검의 발적, 열감이 나타날 수 있다.
4. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
5. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. (사용경험이 없음.)

저장방법

기밀용기, 실온보존(1~30℃)

포장단위

100캡슐(10캡슐/PTP x 10), 500캡슐/병



Eisai Co., Ltd.
4-6-10 Koishikawa,
Bunkyo-ku, Tokyo
JAPAN 112-8088



제조의뢰자
부광약품주식회사
경기도 안산시 단원구 동안로 47

제조사

씨제이헬스케어주식회사
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.
제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL. 080-933-2233

http://www.bukwang.co.kr

- 이 첨부문서 작성일자(2018년 01월 02일)이후 변경된 내용은 <http://www.bukwang.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) ➡ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 만약, 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) ➡ (의약품 유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.
- 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 보관하십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.