

피부질환치료제 트리코트 크림 0.1%

분류번호: 264
일반 의약품
(전문의약품, '13.3.1부터)

트리코트 크림은 국소용 부신피질호르몬제인 Triamcinolone Acetonide 제제로 종래의 스테로이드 제제에 비해 항염증, 항소양 및 항알러지작용이 강한 새로운 국소용 부신피질호르몬제제입니다. 트리코트 크림은 특수 알집의 크림 기제를 사용하여 피부면에 잘 퍼지고, 끈적거리거나 의류를 더럽히지 않습니다. 따라서 트리코트 크림은 건성피부질환과 습성피부질환 등에 사용이 간편하며 효력이 뛰어난 제제입니다.

■원료약품 및 그 분량 : 1g 중
트리암시놀론 아세토니드(KP) 1mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 1mg
파라옥시벤조산프로필(KP) 1mg

■성상 : 백색의 크림제

■약리작용 :

- 1) 항염작용 · 항알러지작용 트리암시놀론 아세토니드는 종래의 국소용 스테로이드제제인 프레드니솔론이나 히드로코티손 등에 비해 효과가 우수하여 접촉성피부염, 습진양, 피부염, 급 · 만성 피부염, 아토피성 피부염, 자가감각 피부염 등에 효력이 뛰어납니다.
- 2) 항소양작용 트리암시놀론 아세토니드 항소양작용이 뛰어나 지루성 피부염, 건선 등에 의한 소양증 및 음부 및 항문 소양증에 뛰어난 진양 효과를 나타냅니다.

■효능 · 효과 :

습진 · 피부염군(방사선피부염, 광피부염, 접촉피부염, 습진양피부염, 만성단순태선(신경피부염), 아토피피부염, 화폐상피부염, 유아피부염, 지루피부염, 박탈피부염), 피부가려움(외음부 포함), 동상, 발레몰린드, 원형탈모증, 악진, 건선, 구진두드러기

■용법 · 용량 :

트리암시놀론아세토니드로서 1일 2~3회 적량 환부에 도포한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 피부결핵, 단순포진, 수두, 대상포진, 종두진환자(면역기능 억제작용에 의해 감염증을 악화시킬 수 있다.)
 - 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 3) 고약 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유 지연 및 감염의 위험이 있다.)
 - 4) 케양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상 · 동상 환자(조직수복, 육아형성을 억제하여 감염증을 악화시킬 수 있다.)
 - 5) 세균, 진균, 바이러스 피부감염 환자(면역을 억제하여 감염증을 악화시킬 수 있다.)
 - 6) 주사(rosacea), 여드름, 입주위피부염 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 2) 유아 및 소아
 - 3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용

다음 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 적절한 처치를 한다.

- 1) 피부감염증 : 피부의 진균성(칸디다증, 백선증 등) 및 세균성(전염성 농가진, 모낭염 등) 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다. (특히 밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽다.) 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항진균제나 항균제 등을 병용하고 그 증상이 빨리 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.

- 2) 기타 피부증상 : 장기 연용에 의하여 피부건조, 스테로이드성 여드름(심상성 여드름(보통 여드름)과 비슷하나 백색의 면포가 다발하는 경향이 있다), 스테로이드성피부(피부위축, 모세혈관 확장), 어린선(漁鱗癬)양 피부변화, 자반, 다모 및 색소탈실, 입주위피부염(입주위 등의 조홍, 구진, 농포, 모세혈관확장 등)등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 서서히 사용을 중지하고 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.
- 3) 과민증 : 피부의 자극감, 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
- 4) नि하수체 · 부신피질계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 뇌하수체 · 부신피질 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.
- 5) 눈 : 안검 피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸쳐 광범위하게 사용하거나, 특히 밀봉봉대법으로 사용할 경우 후낭하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적주의
 - 1) 피부 감염을 수반하는 습진, 피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이한 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신작용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려한다.
 - 2) 대량, 장기간, 광범위하게 사용함으로써 코르티코이드 전신투여와 같은 증상이 나타날 수 있으므로 정기적으로 의사의 검진을 받는 것이 필요하다.
 - 3) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
 - 4) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
 5. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 사용을 피한다.
 - 2) 피부에 장기간, 광범위하게 사용시에는 수유를 하지 않는다.
 6. 소아에 대한 투여
 유아 및 소아에게 이 약의 장기간에 걸쳐 대량 사용 또는 밀봉봉대법에 의하여 발육장애를 가져올 수 있다. 기저귀도 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있다.
 7. 고령자에 대한 투여
 일반적으로 고령자에 투여시 부작용이 나타날 수 있으므로 대량 또는 장기간 광범위하게 밀봉봉대법을 사용하는 경우 특히 주의한다.
 8. 적용상의 주의사항
 - 1) 안과용으로 사용하지 않는다.
 - 2) 화상이나 면도 후 등 치료이외의 목적으로는 사용하지 않는다.

■저장방법 : 기밀용기, 실온보관

■포장단위 : 10g, 450g



● 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

이 첨부문서 작성일자 2012년 11월 01일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎080-776-1472에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK011112

동광제약주식회사
경기도 평택시 산단로 115
●수신자부담 소비자상담실 : 080-776-1472

KGMP 본 제품은 우수약품
적격업체제품 제조관리기준에
적합히 제조되었습니다.