

근육이완제

프라미날 주사

PRAMINAL (프리디놀메실산염)

분류번호:122

전 문 의 약 품

1949년 Cunningham 이 Piperidine propylalcohol유도체의 확실한 진경작용을 발견한 이래 그 유도체 연구가 활발히 이루어진 결과 3-piperidine-1,1-diphenyl-propanol-(1)-methane-sulfonate 즉, Pridinol mesylate가 합성되기에 이르렀습니다.

프라미날 주사는 뇌간망양제, 연수, 척수 등에 작용하며 특히, 골격근 경련에 관여하는 척수의 Poly-synapse 반사로의 개재 neurone을 선택적으로 억제함으로써 골격근 긴장에 수반되는 근경련의 완화 및 그에 따르는 이차적 동통의 악순환을 차단해주는 근이상긴장완해제입니다.

■원료약품 및 그 분량 : 1앰플 중

프리디놀메실산염(KPC) 2mg
첨가제 : 주사용수(용제)
타우린
염화나트륨

■성 상 : 무색의 액체가 충전된 등명한 갈색앰플제

■약리작용

1. 척수 및 상위중추에 작용하여 Polysynapse 반사로를 선택적으로 억제하여 근의 이상 긴장을 완화시킵니다.
2. 병적으로 항진된 골격근의 경련, 연축을 완해시켜 이차적 동통으로서의 악순환을 제거시킵니다.
3. 근이완작용이 확실하며 정상적인 골격근에는 영향이 없고 속효성이며 지속적인 작용을 발휘합니다.

■효능·효과

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 경견완 증후군, 견관절 주위염, 변형성 척추증

■용법·용량

성인 : 프리디놀메실산염으로서 1회 2mg 1일 1회 근육 또는 정맥주사합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 녹내장 환자(항콜린작용에 의해 안압을 상승시킬 수 있습니다.)
- 3) 전립선비대에 의한 배뇨곤란환자(항콜린작용에 의해 배뇨장애를 악화시킬 수 있습니다.)
- 4) 중증의 심질환 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 5) 마비성 장폐색증 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 6) 거대 결장증 환자
- 7) 급성 폐부종 환자
- 8) 빈맥 환자
- 9) 중증의 동맥경화증 환자
- 10) 위장관부위협착 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

간 · 신장에 환자

4. 부작용

- 1) 과민증 : 발진, 두드러기, 드물게 아나필락시양 증상, 속유사 증상(주사제에 한함)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
- 2) 정신신경계 : 때때로 어지러움, 비틀거림, 실신, 졸음, 불안, 환각, 무력감, 권태감 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 합니다.
- 3) 골격근 : 드물게 근이완, 근무력증, 장시간 정좌불능 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 소화기계 : 구갈, 드물게 구역·구토 등이 나타날 수 있습니다.
- 5) 피부 : 한성분비강소, 홍반
- 6) 눈 : 시조절장애, 협응각형복내장이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동 능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

6. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의해 상호작용이 증강될 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의합니다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
- 2) 다음 약물과의 병용에 의해 이 약의 항콜린작용이 증강될 수 있습니다. : 아만타딘, 퀴니딘
- 3) 도파민길항제(메토클로프라미드 등)와 병용시 위장관 작용을 상쇄시킵니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

8. 소아에 대한 투여

유 · 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

10. 적응상의 주의

- 1) 이 약의 주사는 경구투여가 불가능한 경우에만 사용합니다.
- 2) 정맥주사
① 생리식염주사액 또는 5% 포도당 주사액에 섞어 사용하는 것이 바람직하나 부득이하게 단독 주사할 경우에는 주사속도를 가능한 느리게 합니다.
② 정맥주사는 환자를 옆으로 눕히고 투여합니다.

■저장방법 : 차광밀봉용기, 실온보관

■포장단위 : 50앰플

● 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

● 이 첨부문서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-115 에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK070214

 **동광제약주식회사**
경기도 평택시 산단로 115
☎ 수신자부담 소비자상담전화 : 080-776-1472

KGMP 적격업체제품
본 제품은 우수제조시설 제조조건
기준에 적합하여 제조되었습니다.
www.dkpc.co.kr