

비마약성 진통제

분류번호:114

전문의약품

타마돌

주

(Tramadol · HCl)

■ **원료약품 및 그 분량** : 1염물 중
타라마돌염산염 (BP) 50mg
첨가제 : 주사용수(용제)

■ **성 상** : 무색 투명한 액이 들어있는 무색 투명한 염결제

■ **약리작용 및 특징**

1. 신속하고 지속적인 효과발현

타마돌은 유효성이 높아 아로로 인한 통증, 신경통, 염증으로 인한 통증, 외상으로 인한 통증, 혈류장애로 인한 통증 등의 급·만성 통증과 진단 및 치료에 수반하는 통증, 특히 수술 후 통증 등의 극심하고 지속적인 통증에 우수한 효과를 나타내어 신속하게 흡수되어 빠른 효과와 긴 작용 시간을 나타냅니다.

2. 우수한 내약성

타마돌은 비마약성 진통제로서 내약성이 우수하여 호흡억제 및 심혈관계에 미치는 영향이 없고, 장관운동 억제로 인한 변비, 배도곤란 등의 다른 마약성 진통제에서 볼 수 있는 부작용이 거의 나타나지 않습니다.

3. 정신적, 육체적 의존성이 나타나지 않습니다.

타마돌은 단기간의 투약에서는 다행감(Euphoria)이나 불쾌감(Dysphoria)등의 정신적인 영향이 없고 장기간의 투약에서도 정신적, 육체적 의존성이 거의 없어 심각한 금단증상은 나타나지 않으며 물린과의 교차의존성도 없습니다. 또한 1일 용량과 진통효과와의 관계에서 내성이 생기지 않음이 입증되었습니다.

4. 강력한 진통효과

타마돌은 중추신경계에 직접 작용하는 강력한 진통제로 통증지각뿐 아니라 통증의 감정적인 요소에 대해서도 현저한 길항효과를 나타냅니다. 또한 Barbituric acid 유도체의 최면시간을 연장시키며 그외에도 항경련작용, 근이완작용이 있습니다.

■ **효능 · 효과**

다음 질환에 사용할 수 있다.
중증 및 중등도의 급만성 동통(각증 압 등), 진단 및 수술 후 동통

■ **용법 · 용량**

- 이 약의 투여량은 환자의 통증 강도와 임상반응에 따라 조정되어야 한다. 일반적으로 통증을 해소할 수 있는 최소 용량을 투여한다.
- 성인 : 타라마돌염산염으로 1회 50-100mg을 정맥주사 또는 근육주사한 후 필요에 따라 4-5시간마다 반복주사한다.
1회 최고 400mg까지 투여할 수 있다.
- 노인 : 임상적으로 2간간는 장애 또는 신기능 장애가 확인되지 않은 75세 이하의 환자에는 용량조절이 필요하지 않다. 75세를 초과하는 환자에서는 이 약의 배설이 지연될 수 있으므로 필요시 투여간격을 조절한다.
- 소아는 장애/특서 환자 또는 간기능 장애 환자 : 신기능 또는 간기능 장애 환자에서는 이 약의 배설이 지연될 수 있으므로, 이러한 환자에는 투여간격의 연장을 고려하여야 한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 경고
- 경장용량의 타라마돌을 투여한 환자에서서 경련이 보고되었다. 이러한 위험성은 1일 최대 권장 용량의 타라마돌염산 염 400mg을 초과하는 용량에서 증가할 수 있다. 추가로, 타라마돌은 발작역치(seizure threshold)를 낮추는 다른 약물을 복용하는 환자에서서 발작 위험을 증가시킬 수 있다. 간질이나 발작위험이 있는 환자는 반드시 필요할 때에만 투여해야 한다.
 - 타라마돌은 의존성이 낮으나, 장기투여에 의한 내약성으로 인해 정신적·육체적 의존성이 발생할 수 있다. 약물남용 또는 의존성이 있는 환자에게는 엄격한 감독 하에 단기간 투여한다.
 - 오피움주사제는 오피기단단시 유리파편이 혼입되어 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 잘단사용하여, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 급성 알코올중독 환자
- 수면제, 진통제, 아편, 항정신성 약물 등 중추신경계 작용약을 중독 환자
- 심한 호흡억제상태 환자(가벼운 호흡억제가 나타날 수 있다.)
- 두부손상, 뇌의 병변이 있는 경우로 의식혼탁의 위험이 있는 환자
- MAO저해제를 투여받고 있는 환자 또는 최근 14일 이내에 투약한 경험에 있는 환자
- 임부, 수유부
- 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 아편에 대해 과민증 및 그의 병력이 있는 환자
- 적절한 치료를 받지 않고 있는 간질 환자
- 마약 금단 증상 치료 목적의 사용

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 모르핀 병증 또는 반복투여 약물(동물 실험에서 가벼운 모르핀 길항작용이 인정되었으므로 금단증상을 일으킬 수 있다.)
- 담도질환 환자(동물 실험에서 대량투여하는 경우 오디팔락근을 수축했다.)
- 간장애 환자(동물 실험에서 혈청 AST · ALT 활성치의 상승이 나타났다는 보고가 있다.)
- 음주 환자
- 아편에 대해 과민증 환자
- 신장애 환자(신기능장애에 이 약 및 이 약의 활성 대사물의 배설속도와 양이 감소되므로 크레아티닌 청소율이 30mL/분 이하인 환자는 투여량을 감소하는 것이 바람직하다.)
- 중추신경억제 약물(알코올, 아편류, 마취제, 폐노지아진계 약물, 신경안정제, 진정수면제)를 투여받고 있는 환자(감량 투여한다.)
- 경련의 병력이 있는 환자(경련 발작을 일으킬 수 있으므로 이 약 투여중에는 관찰을 충분히 한다.)
- 트라마돌은 아편(opioid) 효능약이지만 모르핀(morphine) 금단 증상을 억제할 수 없으므로 마약 금단 증상 환자에 대한 적절한 대체요법은 아니다.

4. 이상반응

- 발작 : 이 약을 상용량 이상 투여시 발작 발생이 증가할 수 있으나 상용량에서도 발작이 나타났다는 보고가 있다. 다음 약을 투여받고 있는 환자에게 발작의 발생가능성을 증가시킬 수 있다.
 - 삼환계 항우울제(이미프라민) 및 다른 삼환계 약물(싸이클로헥사프란, 프로메타진 등)
 - 선택적 세로토닌 재흡수 저해제(SSRI 항우울제 또는 식욕억제제)
 - MAO저해제
 - 신경이완제 (페노치아진, 부티로페논)
 - 메플로린
 - 부프로피온
 - 신경이완제- 기타 발작 역치를 감소시키는 약물
또한 간질 환자, 발작의 병력이 있는 환자, 발작의 위험이 있는 환자(두부손상, 대사장애, 알코올 및 약물중단 환자, 중추 신경계 감염 환자)에서도 발작의 발생가능성이 증가시킬 수 있다.
이 약 과량투여시 날록손의 투여로 발작의 위험이 증가할 수 있다.
- 과민증 : 속, 아나필락시스 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 또한 초회항 투여시 중증 아나필락시아상 증상이 나타났다는 보고가 있다(드물게 치명적임). 또한 가려움, 두드러기, 기관지경련, 혈관부종이 나타날 수 있다.
- 호흡기계 : 때때로 호흡억제가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 인공호흡(필요할 경우 산소호흡)이나 디모르폴라민이 투여가 유효하다. 또한, 드물게 호흡곤란이 나타날 수 있다. 통상적인 연관성은 아직 정립되지 않았으나, 천식발작과 보고되었다.
- 순환기계 : 때때로 심계항진, 냉한, 흉내고민, 혈관확장, 혈압저하, 부정맥, 인면창백이 나타날 수 있으며 드물게 심혈관계에 영향을 미칠 수 있다. 또한 실신, 기립성 저혈압, 빈맥이 나타날 수 있다. 이러한 이상반응은 특히 경맥투여시나 육체적 스트레스가 있는 환자에서서 발생할 수 있다. 또한, 드물게 서맥과 혈압상승이 나타날 수 있다.
- 중추신경계 : 때때로 졸음, 수면, 두통, 두중감, 흥분, 진전, 이명, 양손의 저린감, 불안감, 허탈, 피로, 권태감, 발한, 어지러움, 휘청거림, 불쾌감, 배도곤란, 구내건조, 구갈, 착란, 협조장애, 다행증, 초조, 수면장애, 인식장애, 환각, 긴장감, 집중장애, 우울이 나타날 수 있다. 드물게 식욕변화, 감각이상, 호흡억제, 간질성 경련, 불수의적 근육수축, 실신이 나타날 수 있다. 권장용량을 상당히 초과하거나 다른 중추 억제 약물을 병용 투여시, 호흡억제가 발생할 수 있다. 간질성경련은 주로 고용량의 타라마돌을 투여한 후, 발작억제치를 낮추는 약물과 병용 투여한 후에 주로 발생했다.

- 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 복부 팽만감, 복염, 복통, 식욕부진, 변비, 구갈이 나타날 수 있다. 흔하지 않게 위장관 자극(상복부 압박감, 고창)이 나타날 수 있다.
- 근골격계 : 고긴장증이 나타날 수 있다. 또한, 드물게 운동약화가 나타날 수 있다.
- 비호생식기계 : 오배, 빈뇨, 폐경중추곤, 배뇨장애, 월경장애가 나타날 수 있다.
- 피부 : 두드러기, 소포진, 스티븐스-존슨증후군이 나타날 수 있다. 흔하게 발한 또는 흔하지 않게 피부반응(에, 간지러움, 발진, 두드러기)이 나타날 수 있다.
- 의존성 : 이 약은 플린현(μ-아편) 약물의 정신적·신체적 의존성을 일으키며 이 약의 남용 및 의존성 사례가 보고되었으므로 아편 의존성 환자에는 투여하지 않는다. 의존 병력이 있거나 만성적으로 다른 아편류를 사용하는 환자에서 신체적 의존성이 재발할 수 있다. 약물 남용 경향이 있는 환자, 약물 의존병력이 있는 환자, 만성적으로 아편류를 사용하는 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 정신질환 : 드물게 환각, 착란, 수면장애, 불안과 약물이 나타날 수 있다. 트라마돌 투여 후 정신적 이상반응이 일어날 수 있으며 그 정도와 특징은 개인에 따라 다르다. (개인의 성격과 치료기간에 의존적임). 이러한 반응에는 기분변화(주로 다행감, 때때로 불쾌감), 활동변화(주로 억제, 때때로 증가), 인지와 감각능력 변화(예, 결정장애, 인식이상)가 포함되며 의존성이 나타날 수도 있다.
- 간담독 이상 : 몇 및 사례에서 트라마돌의 치료 기간 동안 간효소 수치 상승이 보고되었다.
- 기타 : 때때로 발열, 열감, 오한, 냉감, 두드러기, 발진, 시각장애, 미각장애, 체중감소, 주사부위의 자극감이 나타날 수 있다. 흔하게 피로가 나타날 수 있으며 드물게 알라지반응(예, 호흡곤란, 기관지경련, 천명, 혈관신경부종)과 아나필락시스 : 위장투여 중단 시와 유사한 금단 증상이 다음과 같이 나타날 수 있다 : 흥분, 불안, 신경과민, 불면, 운동과다, 진전 및 위장관 증상
트라마돌 투여중단 시 매우 드물게 다음과 같은 기타 증상이 나타날 수 있다 : 공황발작, 심한 불안, 환각, 감각이상, 이명과 비정상적 투여기간의 증상
- 일반적 투여
- 1) 약물 투여할 경우 구역, 드물게 구토, 졸음, 어지러움, 휘청거림 등의 증상이 나타날 수 있으므로 외래환자에 투여하는 경우에는 충분히 안정시킨 후 안전을 확인하고 귀가시킨다.
- 2) 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험이 따르는 기계조작에 종사하지 않도록 주의한다.
- 3) 미세한 동통에는 사용하지 않는다.
- 4) 이 약을 장기투여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 투여기간을 조정하거나 일시적으로 휴약 기간을 거둔다.
- 5) 급성 복부 질환 환자의 상태를 오진하게 할 수 있다.
6. 상호작용
- 1) 중추신경계 작용약품(수면제, 진정제, 알코올) 등과 병용투여시 진정효과가 강화된다.
- 2) 타마돌은 MAO 저해제와 병용투여해서는 안된다. 미약 페티딘(pethidine)을 투여하기 전 14일 이내에 MAO저해제를 투여한 환자에서서 중추신경계, 호흡기, 심혈관계 등에 대해 생명을 위협하는 약물상호작용이 관찰되었다. 트라마돌의 치료 기간 동안 MAO 저해제와의 동할한 약물상호작용의 가능성을 배제할 수 없다.
알콜을 포함한 다른 중추신경 억제 약물과 트라마돌의 병용투여는 중추신경계에 대한 효과를 증가시킬 수 있다.
- 2) 카르보마제핀(호소 유도체)과의 동시 또는 전 투여는 트라마돌의 진통효과를 감소시키고 작용효과를 줄일 수 있다.
- 3) 드물게 디곡신 독성과 와르파린의 효과를 변경시켰다(프로트롬빈 시간을 연장)는 보고가 있다.
- 4) 퀴닌과 병용시 상호 이상반응이 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 5) 디곡신과 병용시 디곡신 독증이 나타났다는 보고가 있으므로 신중히 투여한다.
- 6) 와르파린과 병용투여시 프로트롬빈 시간의 연장 등 와르파린의 효과에 영향을 나타냈다는 보고가 있다.
- 7) 약물동력학실험 결과 시메티딘(호소 억제제)과의 병용 또는 전투여로 인한 임상적 상호작용이 발생할 가능성은 거의 없다.
- 8) 트라마돌 같은 순수 효능약의 진통효과는 이론적으로 혼합 효능/길항제(예, 부프레노르핀, 날부민, 펜타조신)과 병용투여 할 경우 감소할 수 있으므로 권장되지 않는다.
- 9) 트라마돌은 경련을 유발할 수 있으며, 선택적인 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI), 삼환계 항우울제(TCA), 항정신병약품, 발작억제를 낮추는 약물과 같이 경련의 역치를 낮추는 약물의 경련 유발 가능성을 높인다.
- 11) 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 또는 MAO억제제와 같은 세로토닌 항진 약물과 트라마돌의 병용 투여 시 세로토닌 증후군이 보고되었다. 세로토닌 증후군의 증상의 예는 다음과 같다 : 착란, 흥분, 빈맥, 진전, 혼수, 발열, 발한, 운동실조, 과다반사, 간대성근경련증, 실사.
세로토닌 증후군은 해당 약물의 투약중단 이후 일반적으로 빠르게 증상이 개선되며, 증상의 특징과 중증도에 따라 치료를 결정해야 한다.

- 리세린리드 : 비선택성 MAO 저해제와 병용투여시 세로토닌 증후군의 발생 위험이 증가할 수 있다. (설사, 빈맥, 발한, 진전, 착란 및 혼수)
- 케토코나졸과 에라소마이신과 같은 사이토크롬 P3A4를 저해하는 것으로 알려진 약물은 트라마돌 대사(N-탈메칠화)와 활성 O-탈메칠화된 대사체의 대사를 저해할 수 있다. 이러한 상호작용의 임상적 중요성은 연구되지 않았다.
- 제현된 수의 연구에 의하면 5-HT3 길항제인 항구토제 온난세드론을 수술 전후에 투여한 환자들에 대하여 수술 후 통증으로 인한 트라마돌 투여가 증가했다.
- 50mg/mL, 100mg/2mL 주사제는 디글로페낙, 인도메타신, 페날부타존, 디아제팜, 플루니트라제팜, 미다졸람, 니트로글리세린 주사제와 배합을 허가한다.
- 임부, 수유부에 대한 투여
- 1) 동물 실험 및 in vitro 실험에서 돌연변이성, 발암성, 생식독성이 나타났으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 병변에는 투여하지 말 것(동물실험에서 고용량의 트라마돌 투여는 장기의 발달, 골화, 신생아 사망에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 트라마돌은 태반을 통과한다. 임신부와 신생아에 대한 트라마돌의 안전성은 입증되지 않았다.)
- 2) 수유부 복용량의 약 0.1%가 모유중으로 분비되므로 수유부에게 투여하지 않는다.
- 3) 출생전 또는 출생중 투여한 트라마돌은 자궁수축에 영향을 주지 않는다. 임신 말기 고용량을 단기간 투여할 경우 신생아 의 호흡 억제가 나타날 수 있다. 임신 중 장기 투여는 신생아에게 금단증상을 야기할 수 있다.
8. 소아에 대한 투여
- 유아, 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
9. 고령자에 대한 투여
- 혈중농도가 약간 상승할 수 있으므로 75세 이상 고령자에는 1일 300mg 이상 투여하지 않는다.
10. 과량투여시의 처치

증상 : 과량투여하는 경우에는 심각한 호흡억제와 발작이 나타날 수 있으며, 다른 중추성 진통제(아편류)의 중독 증상과 유사한 증상이 나타날 수 있다. : 동공수축, 구토, 심혈관 허탈, 의식 소실에 따른 혼수, 경련, 호흡 억제에 따른 호흡 곤란
처치 : 일반적인 응급처치를 실시한다. 기도를 확보하고, 증상에 따라 호흡과 심혈관 기능을 유지한다. 경구 체제 과량 복용 시 구도의식 있는 환자) 또는 위세척을 실시한다. 호흡곤란에 대한 해독제는 날록손이다. 동물실험에서 바르비탈계 약물 또는 벤조디아제핀계 약물에 의한 이 약의 과량투여에 의한 경련이 억제되며 날록손에 의해서서 증가되었다.
투석 4시간동안 이 약의 7% 이하가 제거되므로 혈액투석은 바람직하지 않다.

11. 적용상의 주의

- 신경 주향부위를 피하여 주사하고, 좌우 교차로 사용하든지 주사부위를 바꾸어 주사한다.
- 주사침을 꽂을 때 고통을 호소하여 혈액의 역류를 보인 경우에는 즉시 침을 뽑아 부위를 바꾸어 주사한다.
- 바르비탈산 유도체(주사제)와 같은 주사기를 사용할 경우에는 침전이 생기므로 같은 주사기에 섞지 않는다.
12. 보관 및 취급상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 약액을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인 이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것
13. 기타

동물실험에서 내성이 나타나므로 연용 및 증량의 경우에는 주의하여 투여한다.

■ **저장방법** : 밀봉용기, 실온보관(~ 30℃)

■ **포장단위** : 50염물

- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- 이 첨부서서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-1472 에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK070214