

● 젤타입의 바르는 소염(항염)진통제

오디스 젤

(케토프로펜)

오디스젤은 최근 임상에서 진통, 항염증, 항류마티스 효과에 대하여 높이 평가받고 있는 케토프로펜(Ketoprofen)성분의 바르는 소염(항염) 진통제입니다. 오디스젤은 무색투명한 젤(Gel)타입으로 흡수성이 우수하여 신속하고 강력한 효과를 나타낼 뿐만 아니라 경구용 소염(항염)진통제의 문제점인 위장장애 등의 부작용과 패취제 등의 부차시 나타나는 피부자극감을 해결한 우수한 제제입니다.

■ 원료약품 및 그 분량 : 1g 중	
케토프로펜 (KP)	30mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.5mg
파라옥시벤조산프로필 (KP)	0.5mg

■ 성 상 : 방향성을 갖는 거의 무색투명한 점액성의 겔제

■ 약리작용

1. 강력한 소염(항염) · 진통작용
오디스젤의 주성분인 케토프로펜(Ketoprofen)은 강력한 소염(항염) · 진통 · 항류마티스 작용을 나타냅니다.
2. 바르는 소염(항염) · 진통제
오디스젤은 국소부위에 직접 바르는 소염(항염)진통제이므로 신속하게 흡수되어 약효를 나타냅니다.
3. 겔(Gel)타입의 제제
오디스젤은 겔(Gel)타입의 제제이므로 피부도포시(바를시) 흡수성이 우수하고 끈적이지 않아 의복을 오염시키지 않습니다.
4. 상쾌한 사용감
오디스젤은 피부자극감이 없고 시원한 느낌을 나타내며 깔끔한 PE(Polyethylene)튜브로 휴대가 간편하므로 운동이나 등산에도 편리하게 사용하실 수 있습니다.
5. 높은 안전성
오디스젤은 경구용 소염(항염)진통제의 문제점인 위장장애 등의 부작용과 패취제의 피부자극감을 해결한 안전성 높은 외용 소염(항염)진통제입니다.

■ 효능 · 효과

다음 질환 및 증상의 진통 · 소염(항염) : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건염(힘줄염) · 건초염(힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상(상처)후의 종창(부기) · 동통(통증)

■ 용법 · 용량 :

증상에 따라 적당량을 1일 1~4회 환부(질환 부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있다)
 - 3) 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있다)
 - 4) 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 랫트에 이 약을 경구투여한(복용한) 실험에서 태아의 동맥혈관수축이 보고되었다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장(곧창자)주입)시 지속성 태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있다.
 - 5) 15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
- 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있다)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 또는 수유부(안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피한다.)
3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
- 1) 드물게 속, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 - 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타난다.
 - 3) 피부 : 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있다. 또한 직사광선(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지한다.
 - 4) 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
4. 기타
- 이 약의 사용 시 주의할 사항
- 1) 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포(바르는)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 한다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입는다. (자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있다.)
 - 2) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다.
 - 3) 피부감염증을 드러나지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균(곰팡이)제를 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의한다.
 - 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의한다.
 - 5) 눈 및 침막에는 사용하지 않는다.
 - 6) 손상된 피부 및 찰과, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.
 - 7) 무좀, 백선 등에는 사용하지 않는다.
 - 8) 밀봉봉대법을 사용하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관

■ 포장단위 : 50g

- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품사전 (<http://drug.mfds.go.kr>) 을 참조하세요.
- 이 첨부문서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-1472에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

DK070214