

골격근이완제

오이몰

(Methocarbamol)

분류번호 : 122

전문의약품

I.M./I.V.

주

■원료약품 및 그 분량 : 1앰플(5mL) 중

메토카르바몰(KP) 500mg
첨가제 : 아황산수소나트륨(안정제) 5mg
주사용수(용제)
마크로골300

■성 상 : 무색의 액체가 충전된 갈색 앰플제

■약리작용 및 특징

1. 척수내의 중간매개 뉴우론에 선택적으로 작용하여, 골격근 경련에 관여하는 시냅스반사를 억제함으로써, 골격근 이완작용을 나타낸다.
2. 근육으로부터 전달되는 비정상적인 신경성 충격을 차단함으로써 골격근의 이상긴장을 해소하고, 근대 사과정을 정상화한다.
3. 항경련작용으로 경련 예방효과를 나타내며, 진정작용을 나타낸다.
4. 근조직, 운동신경종환, 신경섬유의 수축기전에는 직접 작용하지 않는다.

■효능·효과

근골격계질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 경견완증후군, 견관절주위염, 변형성척추증

■용법·용량

성인 : 메토카르바몰로서 1회 500mg을 근육 또는 정맥주사한다. 1회 1g, 1일 총투여량 3g을 초과하지 않으며 연속적으로 3일을 초과하여 투여하지 않는다.
단, 동통이 지속시 경우에 따라서 48시간 후 주의하여 동일과정을 반복할 수 있다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 유사화합물(메프로바메이트 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 신장에 또는 신장애가 의심되는 환자
- 3) 중증의 근무력증 환자
- 4) 혼수 또는 전혼수상태 환자
- 5) 뇌손상, 간질 또는 경련의 병력이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 간장에 환자 (증상을 악화시킬 수 있다.)
- 2) 아황산수소나트륨이 함유되어 있으므로 아황산 아나필락시스와 같은 알레르기를 일으킬 수 있으며, 일부 감수성 환자에서는 생명을 위협할 정도 또는 이보다 약한 천식발작을 일으킬 수 있다. 일반 사람에서의 아황산감수성에 대한 총괄적인 빈도는 알려지지 않았으나 낮은 것으로 보이며 아황산 감수성은 비 천식 환자보다 천식 환자에서 빈번한 것으로 나타났다.

4. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기, 가려움, 드물게 속유사증상 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 때때로 서맥, 혈압저하 등이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 휘청거림, 운동실조, 두통, 두중감, 졸도, 실신, 드물게 시력불선명 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
- 4) 소화기계 : 때때로 구역·구토, 식욕부진, 가슴쓰림·위정제감·위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 5) 감각기계 : 때때로 금속성의 미감을 느낄 수 있다
- 6) 기 타 : 발열, 비충혈이 나타날 수 있다.
- 7) 주사부위 : 때때로 동통, 경결, 드물게 혈전성정맥염이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

6. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 단독투여하는 것이 바람직하나 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO 저해제
- 2) 염산톨페리손과 병용투여시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

8. 소아에 대한 투여

영·유·소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어있지 않다.

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

10. 임상검사에 대한 영향

요중 5-히드록시인돌초산 및 요중 바닐만델산치를 상승시킨다.

11. 적응상의 주의

- 1) 경구투여가 부적당한 경우에만 주사를 사용한다.
- 2) 정맥주사시에는 생리식염주사액 또는 5%포도당주사액에 혼합하여 사용할 수 있으며, 단독투여할 경우에는 분당 3mL이하의 속도로 직접 정맥에 주사한다.
- 3) 주사시에는 환자를 옆으로 눕혀서 투여한다.
- 4) 앰플절단시 유리 미소편의 혼입을 피하기 위하여 에탄올면 등으로 대고 절단하여 사용한다.

■저장방법 : 밀봉용기, 실온보관

■포장단위 : 5mL×50앰플



○ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 을 참조하세요.

○ 이 첨부문서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-1472에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK070214



동광제약주식회사

경기도 평택시 산단로 115

● 수신자부담 소비자상담실 : 080-776-1472

KGMP

적격업체제출

본 제품은 우수약품
제조관리기준에 적합
하게 제조되었습니다.