

외상(상처) · 피부감염 · 화상

분류번호 : 269

일반 의약품

# 나드란

연고

**나드란 연고**는 USP에 수재되어 널리 사용되고 있는 3종의 항생물질과 국소마취작용을 가진 Pramoxine HCl이 첨가되어 있는 새로운 피부감염증 치료제입니다.

**나드란 연고**는 Bacitracin Zinc, Polymyxin B sulfate와 광범위 항생제인 Neomycin sulfate가 복합되어 포도상구균(포도알균), 연쇄상구균, 녹농균 등에 최대 강도의 3중 항생효과를 나타낼 뿐 아니라 감염을 방지하며 화상 · 절상(베인 상처) · 찰과상(긁힌 상처) 등의 상처치유를 촉진시켜 줍니다.

**나드란 연고**는 종래의 항생제 연고와 달리 새롭게 Pramoxine HCl이 첨가되어 상처부위의 통증을 경감시키는 복합 항생제 연고입니다.

## ■원료약품 및 그 분량 : 1g 중

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 네오마이신황산염(KP)             | 3.5mg(역가)      |
| 바시트라신아연(KP)              | 500I.U.(역가)    |
| 폴리믹신B황산염(KP)             | 10,000I.U.(역가) |
| 프라목신염산염(USP)             | 10mg           |
| 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) | 0.8mg          |
| 파라옥시벤조산프로필(KP)           | 0.2mg          |

■성 상 : 흰색 또는 옅은 황색의 연고제

## ■약리작용

### 1. 우수한 피부감염 치료효과

나드란은 각종 형태의 농피증(고름피부증)을 일으키는 포도상구균(포도알균), 연쇄상구균 같은 그람 양성균 및 그람음성균에 감수성이 있는 3가지 항생제가 복합처방되어 농가진(고름딱지증), 농창, 습진, 포진(물집), 지루성피부염과 기타 외상(상처) · 화상의 염증 및 화농(끓음)증에 우수한 치료효과를 나타냅니다.

### 2. 진통효과

나드란은 Pramoxine HCl의 강력한 국소마취작용에 의해 피부자극으로 인한 통증을 경감시킵니다.

### 3. 자극감 해소

나드란은 통증을 완화시켜 상처부위를 진정시키고 마찰을 감소시켜 주며 따끔따끔한 피부 자극감을 없애줍니다.

### 4. 안전성

환부(질환부위)에 도포시(바를시) Penicillin같은 피부과민반응을 유발하지 않으며 또한 국소자극 작용이 없어 도포시(바를시) 쓰러거나 아프지 않습니다.

## ■효능 · 효과

- 감수성균에 의한 화상감염, 외이도(바깥귀길)염
- 1차피부질환[농가진(고름딱지증), 농창, 심상성 모창(털종기증), 조갑주위염(손발톱주위염)], 2차피부염[습진, 포진(물집) 및 지루 피부염, 외과 절개 및 피부이식후 감염증]
- 기타 외상(상처)의 염증 및 화농(끓음)증

## ■용법 · 용량

2세 이상 성인 : 1일 1~3회 환부(질환부위)에 적당량을 바른다.

## ■사용상의 주의사항

### 1. 일반적 주의

- 1) 감작(과민상태로 만듦)되어 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 감작증후[가려움증, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집) 등]가 나타날 경우에는 사용을 중지할 것.
- 2) 내성균 또는 비감수성균이 발육과다를 초래할 수 있다. 이러한 현상이나 자극, 과민증, 중복감염이 생기는 때에는 적절한 치료를 해야 할 것.
- 3) 광범위한 화상, 궤양이 있는 피부에는 장기간 사용하지 말 것.

### 2. 다음 환자에는 사용하지 말 것.

- 1) 아미노글루코사이드계 항생제 및 바시트라신에 의한 과민증이 나타난 적이 있는 환자.
- 2) 고막 천공(뚫림)이 있는 환자

### 3. 부작용

- 1) 과민증 : 발진등의 과민증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지할 것.
- 2) 장기 연용(계속 복용) : 신장애(신장장애), 난청(귀먹음)이 나타날 가능성이 있으므로 장기 연용(계속 복용)을 피할 것.

### 4. 적용상의 주의사항

- 1) 안과용으로는 사용하지 말 것.
- 2) 2주 이상 사용하여도 증상 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.

### 5. 보존 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고) 서늘한 곳에[밀전하(뚜껑을 꼭 닫아)] 보존할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

## ■저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## ■포장단위 : 15g



○ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

● 이 첨부문서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 (홈페이지 : [www.dkpc.co.kr](http://www.dkpc.co.kr))나 ☎080-776-1472)에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK070214

 **동광제약주식회사**  
경기도 평택시 산단로 115

● 수신자부담 소비자상담실 : 080-776-1472

**KGMP**

적격업체제품

본 제품은 우수의약품  
제조관리기준에 적합  
하게 제조되었습니다.