

항바이러스제

메노바 크림

MENOVA (Acyclovir)

분류번호 : 269

일 반 의 약 품

■ 원료약품 및 그 분량 : 1g 중

아시클로버(B.P)	50mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
파라옥시벤조산에틸(KP)	1mg

■ 성 상 : 전질균등한 백색의 크림

■ 약리작용

1. 유효성

메노바크림은 기존 항바이러스제인 Idoxuridine, Trifluorothymidine, Vidarabine보다 항바이러스 효과가 10~160배 더 강력합니다.

2. 선택적 작용

메노바크림은 포진(물집)바이러스 감염 세포내에서 포진(물집)바이러스가 생산하는 특이효소인 Thymidine Kinase에 의한 인산화(Phosphorylation)에 의해 활성형 아시클로버(Acyclovir triphosphate)가 됩니다. 이 활성형 아시클로버는 Viral DNA Polymerase 작용을 선택적으로 저해하므로 새로운 포진(물집)바이러스 세포의 DNA 합성만을 억제하여 증식을 억제함으로써 치료효과를 나타냅니다.

3. 안전성

메노바크림은 포진(물집)바이러스(Herpes Virus)감염 세포에만 선택적으로 작용하고 정상 세포의 α -DNA Polymerase에는 영향을 미치지 않으므로 독성이 거의 없습니다.

■ 효능 · 효과

단순포진(물집) 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순포진 포함)

■ 용법 · 용량

- 1) 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.
- 2) 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있거나 화학적 불내성 환자
- 2) 수유부
- 3) 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 에이즈 환자 또는 골수이식 환자 등 면역결핍 환자
- 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 게양이 생긴 생식기 부위의 특성상 이 약의 사용으로 인해 압통(누르는 통증) 등의 불쾌감을 느낄수 있다.

- 2) 일시적인 작열감(화끈감), 자통(찌르는 것 같은 아픔)을 포함하는 가벼운 동통(통증) 및 접촉피부염, 홍반(붉은 반점)성 발진, 습진, 알레르기반응 및 때때로 도포(바르는) 부위의 자극감, 가려움, 외음염, 안면 부종(부기), 피부 탈색, 두드러기, 발진, 소수포성(물집) 발진이 나타날 수 있다.

- 3) 홍반(붉은 반점), 가려움이 나타나거나 피부가 약간 건조해지고 벗겨질 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 치료는 가능한 한 초기에 시작하고, 재발성인 경우에는 전구증상 또는 병소(아픈 부위)가 처음 나타날 때 시작하는 것이 바람직하다.
- 2) 정해진 용법·용량 및 투여기간을 지키고, 징후나 증상이 없는 사람에게는 사용하지 않는다.
- 3) 이 약은 타인으로의 감염이나 재발성 단순포진(물집) 감염증의 예방 목적으로 사용하지 않는다.
- 4) 이 약의 내성 발생에 대한 근거는 없으나 그 가능성을 배제할 수는 없다.
- 5) 이 약물을 희석(묽게 함)하거나 다른 약물을 혼합하기 위한 기제로 사용하지 않는다.

5. 상호작용

이 약과 연관성은 밝혀지지 않았으나, 전신 투여한 아시클로버의 혈장 반감기 및 AUC가 프로베네시드에 의해 증가하였다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 토끼, 랫트, 마우스 등에 아시클로버를 전신 투여한 동물실험에서 기형발생은 관찰되지 않았으나, 랫트의 모체에 신장장애(신장장애)를 유발할 정도의 용량을 피하(피부 밑) 투여시, 태자의 머리 및 꼬리의 이상이 나타났다.
- 2) 임부에 대한 투여 경험이 많지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 사용한다.
- 3) 이 약 사용 중에는 수유를 하지 않는다.(전신투여 후 아시클로버가 유즙 중으로 분비된다는 보고가 있다.)

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

8. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.
- 2) 안과용으로 각막, 점막에 사용하지 않는다.
- 3) 이 약을 입이나 눈 또는 질과 같은 점막에 사용할 경우, 자극감이 나타날 수 있다.
- 4) 이 약이 신체의 다른 부위로 퍼지거나 타인에게 감염시키는 것을 방지하기 위해 골무나 고무장갑을 낀 상태에서 바른다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ 포장단위 : 5g

- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- 이 첨부문서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr 나 ☎ 080-776-1472에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK070214

 **동광제약주식회사**
경기도 평택시 산단로 115

KGMP 본 제품은 우수 의약품
제조관리기준에 적합
하게 제조되었습니다.