

● 강력한 외용 질염치료제

카네마졸 100mg질정

(클로트리마졸)

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

클로트리마졸(KP) 100mg

■ 성 상 : 백색의 장방형 질정제

■ 효능·효과

칸디다성 질염, 트리코모나스성 질염

■ 용법·용량

성인 : 보통 1일 1회 클로트리마졸로서 100mg을 연속 6일간 취침시에 질내 깊숙이 삽입한다. 단기요법으로 보통 성인 1일 1회 클로트리마졸로서 200mg을 연속 3일간 취침시 질내 깊숙이 삽입한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약에 과민증 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

때때로 국소 작열감(화끈감), 자극감, 동통(통증), 구진, 하복부(배부분)경련, 부종(부기), 두드러기, 홍반(붉은 반점), 가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 가벼운 빈뇨 등의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적주의

1) 생리기간중에는 되도록 사용하지 않는다.

2) 트리코모나스질염의 완벽한 박멸을 위해서는 구강(입안) 트리코모나지움의 치료가 요구된다.

3) 외음부염이나 칸디다성 귀두염이 수반된 경우 추가적으로 클로트리마졸크림 제제를 사용하는 것이 바람직하다.

4) 재감염을 막기 위해서는 개인이 사용하는 수건이나 내의 등을 매일 바꾸어 입고 입었던 것은 삶아서 세탁하는 것이 바람직하다.

5) 치료 후에도 증상이 계속되면 다른 항진균(곰팡이) 요법을 사용하기 전에 다른 병원균을 제거해야 한다.

4. 상호작용

이 약은 콘돔, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

임신 1기에는 약물의 치료효과가 위험성을 상회(웃돌다)하는 경우에 한해 신중히 투여한다. 임신 1기에 자발적 유산위험이 높아질 가능성이 있기 때문이다. 임신 2, 3기에는 위의 위험성이 관찰되지 않는다. 임신기간 중 사용시에는 삽입기구의 사용은 피한다.

6. 수유부에 대한 투여

수유부에는 사용하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

동물실험에서 고용량의 경구투여시(복용시) 태아독성이 나타났다는 보고가 있다. 실수로 경구복용한 경우 가능한 빨리 위세척 등의 처치를 한다.

8. 적응상의 주의

이 약은 질에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 않는다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관

■ 포장단위 : 6정

● 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관

(<http://drug.mfds.go.kr>) 을 참조하세요.

● 이 첨부문서 작성일자 2014년 2월 7일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpc.co.kr

나 ☎ 080-776-1472에서 확인할 수 있음

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

DK070214