



글루타티온은 체내 약물 또는 외부물질(Xenobiotics)과 결합하여 배출함으로써 생체 이물질을 해독해 줍니다.*

*Liyun Yuan et al, Mol Aspects Med. 2009 Feb-Apr;30(1-2):29-41.

내 몸 해독이 필요할 때 타치온정

50밀리그램
(글루타티온
(환원형))

[제품명] 타치온정 50밀리그램 (글루타티온(환원형))

[유효성분] 이약 1정 (254.4mg) 중

글루타티온(환원형) (KP) 50mg

[기타첨가제] 미결정셀룰로오스 101, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 AMBII 화이트 88A180040, 오파드라이 화이트 20A680000, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 원형 필름코팅정

[효능 효과] 약물중독, 자가중독

[용법 용량] 성인: 글루타티온으로서 1회 50~100mg (1~2정), 1일 1~3회 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의주의사항]

1. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있습니다.

2) 소화기계: 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통 등이 나타날 수 있습니다.

2. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 90정/병, 180정/병

[최신정보 확인방법] 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002 (고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223 (한국의약품안전관리원)

작성일자: 2020.07.01

TAT90-20G001

[제조의뢰자]

동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23 (1, 2A, 4A층)

[제조자]

(주) 마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18



윤성기(대표이사) 1 한국소비자원