

종합소화효소제

일반의약품



소비자충실경영 인증

베스자임®

Beszyme® Tablet

[원료약품 및 분량] 이 약 1정(693.0mg) 중

- 유효성분
 - 위용부분 : 디메티콘(NF) - 40mg
 - 장용부분 : 판크레아틴(별규) - 400mg [지방소화력 10,000 FIP 단위 / 단백소화력 500 FIP 단위 / 전분소화력 7,500 FIP 단위]
브로멜라인(KP) - 30mg[단백소화력 15,000 브로멜라인 단위]
- 첨가제(타르색소) : 적색40호
- 기타 첨가제 : 무수인산칼슘, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 아크릴이즈93018359화이트, 염화나트륨, 유당수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스(LH-11), 크로스카르멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 호화전분, 히프로멜로오스2910

[성상]

이 약은 분홍색의 타원형의 장용성 내충을 포함하는 이중제피정입니다.

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법·용량]

성인 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담 시 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

BSZT-8M019

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100정/병, 500정/병

[최신정보 확인방법]

최신의 품목허가 또는 신고사항은 식약처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

[문의전화] 고객센터팀 : 080-920-1001

※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 **한국의약품안전관리원(1644-6223)**으로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

®등록상표

- ※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염·손상된 의약품을 구입하였을 때에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

BSZT-8M019

첨부문서 작성 : 1996. 9

첨부문서 개정 : 2018. 12



東亞ST



동아에스티

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23 (2B, 3, 4B층)