

타나민® 은행엽건조엑스 정 40mg

TANAMIN® Tablet 40mg EGb 761®

어지러움, 두통 / 기억력 · 집중력 감퇴 · 치매성 증상 / 말초동맥순환장애
간헐성 파행증(이따금 절뚝거림) / 이명(귀울림)

Dizziness / Dementia Symptoms / Blood Circulation / Intermittent Claudication / Tinnitus

[원료약품 및 보량] 이 약 1정(270mg) 중

유효성분: 은행엽건조엑스(생규) 40mg

동물유래성분: 유당수화물(소, 우유)

기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 오파그로스2클리어, 옥수수전분, 콜로이드성아산화규소, 크로스 카르멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜 6000, 황색산화철, 히프르멜로오스2910

[성상] 황도색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 주 효능효과

- 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

[용법·용량]

1. 성인

- 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 1일 3회, 1회 1정 복용한다.
- 기질성 뇌기능 장애: 1일 3회, 1회 1정 복용한다.
- 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 이 약에 과민증 환자
- 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것

- 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿰론, 와파린)), 항혈소판제(예: 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
- 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 수술이 예정된 자
- 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 이상반응

① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

• 어지러움 • 가려움증

③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 약과의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관

[포장단위]

30정/병, 60정/병, 90정/병, 200정/병, 500정/병,
90정(10정/PTPX9), 100정(10정/PTPX10)

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 확인은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스(수신자 요금부담)080-070-0701으로 하시기 바랍니다.

의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은
한국 의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

☎ 1644-6223, 14-3330 ☐ karp.drugsafe.or.kr

신경대장 의약품부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

보상범위 사망일시보상금, 장애비, 장애일시 보상금, 진료비

※ 첨부문서 개정연월 : 2026년 06월 08일

[제조·판매사]

ⓧ 유유제약

서울사무소 : 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩
본사 · 공장 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94

[공동판매사]

ⓧ 동아ST

본사 : 서울시 동대문구 천호대로 64

[원료공급사]

Under the agreement of
Dr. W. Schwabe, Karlsruhe, Germany