

의약품 분류번호	239 기타의 소화기관용약
-------------	----------------------

가나칸정 50mg
 | 이토프리드염산염 |

새로운 개념의 소화관운동개선포제
GANAKHAN tab. 50mg
 | Itopride HCl |

전문의약품

원료약품의 분량

1정 중 : 이토프리드염산염(KP).....50mg

성상

백색의 필름코팅정

효능·효과

기능성소화불량으로 인한 소화기증상(복부팽만, 상복부통, 식욕부진, 속쓰림, 구역, 구토)

용법·용량

성인 : 이토프리드염산염으로서 1회 50mg을 1일 3회 식전에 경구투여합니다. 증상에 따라 적절히 감량합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 과민반응의 병력이 있는 환자
- 위장관운동자극이 유해한 환자(예, 위장관출혈, 기계적 막힘 또는 천공이 있는 환자)
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당- 갈락토오스 흡수장애(glucose galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 이상반응

1) 중대한 이상반응

- 쇼크 및 아나필락시스모양증상 : 쇼크, 아나필락시스모양증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰합니다. 혈압저하, 호흡곤란, 후두부종, 두드러기, 청색, 발한 등이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 합니다.
- 간기능장애 및 황달 : AST, ALT, γ -GTP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰합니다. 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 합니다.

2) 기타의 이상반응

- 소화기계 : 구역, 때때로 설사, 변비, 복통, 타액증가 등이 나타날 수 있습니다.
- 정신신경계 : 때때로 두통, 초조감, 수면장애, 어지럼 등이 나타날 수 있습니다.
- 내분비계 : 여성형유방증, 때때로 프로락틴의 상승이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 합니다.
- 혈액계 : 혈소판감소, 때때로 백혈구 감소가 나타날 수 있으므로 혈액검사를 행하는 등 관찰을 충분히 행하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 합니다.
- 신장 : 때때로 BUN, 크레아티닌의 상승이 나타날 수 있습니다.
- 간장 : AST, ALT, γ -GTP, ALP 상승이 나타날 수 있습니다.
- 과민반응 : 드물게 발진, 발적, 가려움이 나타날 수 있으며, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 합니다.
- 추체외로증상 : 진전이 나타날 수 있으며, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 조치를 합니다.

(9) 기타 : 때때로 가슴·등통증, 피로감이 나타날 수 있습니다.

3) 국내 시판후 조사결과

국내에서 6년 동안 3,252명을 대상으로 실시한 시판후 조사 결과 추가로 나타난 이상반응은 다음과 같으며 약과의 인과관계는 확실하지 않습니다 :

- 속쓰림(2명), 구갈(1명), 복부팽만(1명)
- 외국에서의 시판후 조사결과
일본에서 실시한 시판후 사용성적조사 결과 5,913례 중 74례(1.25%), 104건(1.76%)에서 이상반응이 나타났습니다. 주요한 이상 반응으로는 설사 13건(0.22%), 복통 8건(0.14%), 변비 8건(0.14%), AST 상승 8건(0.14%), ALT 상승 8건(0.14%) 등이 있습니다.

3. 일반적 주의

- 이 약은 아세틸콜린의 작용을 증강하므로 그 전에 유의하여 사용합니다.
- 소화기증상의 개선이 나타나지 않는 경우, 장기에 걸쳐 사용해서는 안됩니다.

4. 상호작용

항콜린제(티퀴준브롬화물, 부틸스코폴라민브롬화물, 티메파툼브롬화물 등)와 병용하는 경우 소화관운동 억제작용으로 인해 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용간격을 두는 등 병용시 주의합니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 임신중의 투여에 대하여 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유 중에는 투여를 피하고 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단합니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리능이 저하되어 있는 경우가 많아, 이상반응이 나타나기 쉬우므로 충분히 관찰을 행하여 소화기증상 등 이상반응이 나타난 경우에는 감량 또는 휴약하는 등 신중히 투여합니다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위

자사포장단위

교환 및 제품문의

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·부패 또는 오손된 제품등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 고객보호팀 1588-2675

첨부문서 작성년월일 : 2015. 1. 6 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조판매원 **jw 중외제약**
제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56