

효과 빠르고 안전한- 브로판 시럽

아이비엽30%에탄올엑스(5~7.5→1)

분류번호 : 222(진해거담제)

500mL

원료약품의 분량 (100mL중)

아이비엽30%에탄올엑스

(5~7.5 → 1)(별규) 700.0mg

첨가제(보존제) :

소르빈산 칼륨(NF)..... 134.0mg

성상

불투명한 흰색의 플라스틱병에 들어있는
독특한 향이 있는 맑은 갈색의 현탁시럽제

※5020626-2130403

사용기한

제조번호

효능·효과 : 만성 염증성 기관지 질환의 증상 개선, 기침을 동반한 호흡기의 급성 염증 완화

용법·용량 : 성인 및 15세 이상 : 아이비엽30%에탄올엑스(5~7.5→1)로서 1회 35~52.5mg을 1일 2~3회 복용합니다. 다만, 1일 최대 105mg을 넘지 않도록 합니다. 6~14세 : 이 약으로서 1회 35mg, 2~5세 : 이 약으로서 1회 17.5mg을 1일 2회 복용합니다.

저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 건조 보관. ※생약제제이므로 침전이 간혹 생길 수 있으나 약효에는 변화가 없으므로 잘 흔들어 사용하십시오.

사용상의 주의사항 (복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후에 복용하세요.)

1.다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자 2) 과당불내성 환자(감미제로 소르비톨 또는 과당 성분을 함유하고 있습니다.) 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.) 4) 수유부(수유부의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.) 2.다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 위염 또는 위궤양 환자 2) 2세 미만의 영·유아(의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 합니다. 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의깊게 모니터해야 합니다.) 3) 코데인 또는 덱스트로메토르판 등 다른 진해거담제가 함유된 제제와 병용 투여시 3.다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 문서를 소지하십시오. 이상반응 발현빈도는 드물게(0.01% ≤, < 0.1%), 매우 드물게(0.01% 미만)로 구분하였습니다. 1)이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 소화기계 : 드물게 설사, 구역 혹은 구토가 나타날 수 있습니다. (2) 피부 : 매우 드물게 췌장염, 발적, 가려움, 두드러기가 나타날 수 있습니다. (3) 호흡기계 : 매우 드물게 호흡곤란이 나타날 수 있습니다. (4) 기타 : 발열, 고름가래가 나타날 수 있습니다. (5)시판후 조사 결과: ①국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 651명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 이상반응의 발현 빈도율은 0.46% (3례/651례)였으며, 복통 2건, 복부팽만감, 구역, 구토, 어지러움이 각 1건씩 보고 되었습니다. ②외국에서 실시된 9,657명의 시판후 조사 결과 아이비엽제제와 항생제/화학요법제 병용시 이상반응이 발현 빈도율이 26%, 항생제 이외의 약제와 병용시 아이비엽 단독 사용에 비해 이상반응 발현 빈도율이 2배로 나타나 상대적으로 이상반응 위험이 증가된다는 보고가 있습니다. 시판 후 조사결과 이상반응은 주로 소화기계 이상으로, 경증이었으며 일시적이었습니다. 이상반응으로 인해 46명(0.5%)이 치료를 중단하였으며, 이상반응은 주로 소화기계(18명 설사)에 의한 것이었습니다. 2)주일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 4.기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2)어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시키십시오. 또한, 이상반응의 발현빈도와 발현부위에 대한 조사가 없었으므로 10세 미만 어린이가 복용할 경우 주의깊게 모니터해야 합니다. 5. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오. O이제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. O이 문안은 2013년 4월 3일자로 작성 되었습니다.

조 제 용 일반의약품



HDPE



(01)08806429006423

제조사 :



중외제약

제이더블유중외제약(주)

충청남도 당진시 송악읍 한진길 56

제조외의사 :

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2 www.ildong.com

공장 : 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : 080-022-1010(수신자부담)