

유산균 소화·정장·영양제

비오비타[®] 과립



원료약품의 분량

(1g 중)

락토바실루스 스포로게네스균(별규) (생균수로서 5.0×10^7 개)	25.0mg
클로스트리디움 부티리쿰균(별규) (생균수로서 1.0×10^7 개)	5.0mg
바실루스 서브틸리스균(별규) (생균수로서 3.0×10^6 개)	3.0mg
티아민질산염(비타민B ₁) (KP)	0.3mg
리보플라빈(비타민B ₂) (KP)	0.2mg
아스코르브산(비타민C) (KP)	5.0mg
니코틴산아미드(KP)	0.1mg
인산수소칼슘수화물(KP)(칼슘으로서 4.658mg)	20.0mg
건조효모(KP)	50.0mg

일반의약품

분류번호 237(정장제)

성상

이 약은 황색의 과립제입니다. (비오비타과립에는 인공색소와 인공감미제가 함유되어 있지 않습니다.)

효능·효과

영양장애(이유기 유아 및 편식아), 식욕부진, 묽은 변, 변비, 장내이상발효, 복부(배부분)팽만감, 정장(특히 인공 영양아의 정장)

용법·용량

소아(1회 복용량) : 3개월 이상 ~ 1세미만	1g(1술갈)	1 ~ 2세	2g(2술갈)
3 ~ 4세	3g(3술갈)	5 ~ 7세	4g(4술갈)

상기 용량(1회 복용량)을 1일 4회 물, 우유, 이유식 등에 타서 복용하십시오.

- 유아는 비오비타과립을 따뜻한 우유나 보리차에 녹여 복용시키며, 특히 분유를 먹이는 아기는 끓인 물을 먹기좋은 정도(50℃)로 식혀 분유와 비오비타과립을 함께 섞어 복용시키면 편리합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하십시오.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
- 3) 2주 또는 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아(갓난아기)에게 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법


기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

120g

※주의

1. 사용기한이 경과한 의약품은 복용하지 마십시오.
 2. 아기의 체질에 따라 설사, 구토, 알러지 증상이 일시적으로 발생할 수 있습니다. 이 경우 증상이 사라질 때까지 기다리셨다가 소량을 다시 복용시켜 동일한 증상이 나타나지 않는 경우에는 적량까지 차차 증량(양을 늘림)해 나가면 됩니다. 소량을 복용시키셨을 때 동일한 증상이 다시 나타나는 경우에는 복용을 중지하십시오.
 3. 본 제품내 유산균체의 색상 차이에 의한 제조번호간 색상이 다소 차이날 수 있으나 제품의 품질에는 아무런 문제가 없으니, 안심하고 복용하십시오.
 4. 이 제품은 영양성분이 다량 함유된 생균제제로 벌레 등 이물질의 혼입 가능성이 있으므로, 사용하신 후에는 마개를 꼭 닫아 보관해 주십시오.
 5. 사용하신 스푼은 물로 씻고 물기를 제거한 후에 용기와 별도의 위생상태로 보관해 주십시오. 스푼을 열탕 소독하게 되면 변형이 일어나므로, 비 오비타과립의 스푼은 열탕소독하지 마시기 바랍니다.
 6. 제품 개봉시 또는 취급시에 포장재(용기, 케이스)로 인하여 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
 7. 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.
 8. 수분이 많은 스푼 사용으로 인해 용기내 과립의 뭉침이 발생할 수 있으므로 사용시 주의하십시오.
 9. 비오비타과립은 물에 100% 용해되는 제품은 아니며, 제품의 일부 성분이 눈으로 확인할 수 있습니다.
- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 1월 28일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.



ILDONG 일동제약

본사 서울특별시 서초구 바우로27길 2
 공장 경기도 안성시 공단로 25
 소비자 상담실 : (전화) 080-022-1010(수신자부담)