

위통, 속쓰림, 소화불량에 -

라니원정

일반의약품

분류번호 234 (제산제)

라니원정은 위산분비 억제작용이 있는 히스타민 H₂ 수용체 길항제(억제제)인 라니티딘염산염과 위산을 중화하는 3종의 제산제가 이상적으로 처방되어 있는 새로운 위장약입니다. 라니원정은 위산에 의한 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역 등의 증상이 빠르게 소실(없어짐)되고 그 효과가 지속적으로 작용합니다.

원료약품의 분량(1정중)

라니티딘염산염(USP)..... 31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)
산화마그네슘(KP)..... 50.0mg
(강열물로서)
규산알루미늄산마그네슘(NF)..... 125.0mg
(Al₂O₃로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)
(건조물로서)
수산화알루미늄산마그네슘 (KPC)..... 100.0mg
(Al₂O₃로서 30.0mg, MgO로서 30.0mg)
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호

성상

이 약은 분홍색의 원형 필름코팅정입니다.



약리작용

1. 위산 중화작용

라니원정에는 3종의 제산제 산화마그네슘, 규산알루미늄산마그네슘, 수산화알루미늄산마그네슘이 들어 있어 위내의 산을 빠르게 중화시킵니다.

2. 위산분비 억제작용

라니원정에는 히스타민 H₂수용체 길항제(억제제)인 라니티딘염산염이 들어 있어 위산분비를 강력하게 억제합니다.

3. 빠르고 지속적인 효과

라니원정은 먼저 3종의 제산제가 위산을 중화시키고, 계속하여 라니티딘염산염이 위산분비를 억제하므로써 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역 등의 증상이 빠르게 소실(없어짐)되고, 그 효과가 지속적으로 작용합니다.

효능 · 효과 : 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

용법 · 용량 : 성인(15세이상, 80세미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용합니다. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 다음 질환으로 치료 받고 있는 환자 : 혈액질환,



신장 · 간장질환, 위 · 십이지장질환, 천식 · 류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)

2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위 · 십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)

3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)

4) 히스타민 H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람

5) 소아(15세미만) 및 고령자(노인)(80세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다), 80세 이상의 고령자(노인)에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있습니다.

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여 할 경우에는 수유하지 않도록 주의합니다.

7) 투석요법을 받고 있는 환자

8) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물 상호작용에 의해 부작용의 발현(드러냄) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.

2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람

3) 고령자(노인)(65세이상) : 80세미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.

4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구 감소 등의 혈액이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.

- 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 6) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 알레르기증상(발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘 염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 2) 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물질 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치경(잇몸)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
- 5) 횡달

4. 일반적 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 2주간을 초과하여 연용(계속 복용)하지 마십시오.
- 3) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있습니다.)
- 4) 정해진 용법을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 5) 기재된 효능이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 6) 장기연용(계속 복용)을 하지 않습니다.
- 7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들의 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
- 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
- 뉴퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)
- 2) 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 사용)하지 마십시오. 다른 위장약을 동시에 복용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 아직 확립되어있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의합니다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다)

8. 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상)

80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

포장단위

12정, 300정

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2014년 3월 19일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 : 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)