

외용 소염(항염) 진통제

일반의약품

케노펜[®]젤

(케토프로펜)

분류번호

264

[진통, 진양, 수렴, 소염(항염)제]

케노펜 젤은 비스테로이드성 소염(항염)진통제인 케토프로펜(Ketoprofen)을 함유하는 젤(gel) 타입의 외용제입니다. 이 약은 일동제약 중앙연구소에서 첨단제약기술(세계특허)을 이용해 만든 새로운 제제로, 다른 외용 소염(항염)진통제보다 피부흡수율을 높여 질환부위에 국소적으로 높은 약물농도를 유지시킴으로써 치료효과를 극대화 시켰습니다. 케노펜 젤은 피부에 도포시 흡수성이 뛰어나 신속하고 강력한 항염증·진통작용을 나타내며 부종(부기)을 효과적으로 가라앉혀줍니다. 또한 피부에 도포시 피부자극감이 없으며, 끈적거리지 않고 시원한 느낌을 줍니다.

원료약품의 분량 (1g 중)

케토프로펜(KP) 30.0mg

성상 : 이 약은 무색의 투명한 젤(gel)제입니다.

약리작용

1. 케노펜 젤은 새로운 기제(PF127)를 사용, 제제화함으로써 타 케토프로펜(Ketoprofen) 제품보다 피부흡수율을 약 6배나 높여 치료효과를 증강시켰습니다.
2. 케노펜 젤은 운동후의 근육통, 근육경직을 완화시켜주고 근육피로를 풀어줍니다. 또한 물리적·기계적 타박상(멍든데), 외상(상처), 염좌(뺨데) 등에 나타나는 염증을 억제하고 통증과 부종(부기)을 신속히 가라앉혀줍니다.
3. 케노펜 젤은 각종 관절염 치료시에도 치료효과가 높고, 반면에 부작용은 경미합니다.
4. 케노펜 젤은 동통(통증)부위에 도포, 맞사지해 줌으로써 빠르게 흡수되어 도포한 피부의 근육층, 국소조직내에 고농도로 분포되므로 우수한 소염(항염)·진통효과를 발휘합니다.
5. 케노펜 젤은 소염(항염)진통제의 경구투여(복용)로 야기되는 소화기 장애가 없으며 혈중으로 거의 흡수되지 않으므로 매우 안전합니다.

효능·효과

다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염) : 퇴행성 관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건염(힘줄염)·건초염(힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기)·동통(통증)

용법·용량

증상에 따라 적당량을 1일 1~4회 환부(질환부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지릅니다.

사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어 보신 후 사용하십시오

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
 - 3) 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있습니다)
 - 4) 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 랫트에 이 약을 경구투여한 실험에서 태자의 동맥 혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성 태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다.

- 5) 15세 미만의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.
 - 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 또는 수유부(안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피합니다.)
3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

 - 1) 드물게 속, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.
 - 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다.
 - 3) 피부 : 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 적사일광(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지해야 합니다.
 - 4) 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 1) 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입습니다.(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있습니다.)
 - 2) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다.
 - 3) 피부감염증을 드러나지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의해야 합니다.
 - 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의해야 합니다.
 - 5) 눈 및 점막에는 사용하지 않습니다.
 - 6) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의합니다.
 - 7) 무좀, 백선 등에는 사용하지 않습니다.
 - 8) 밀봉봉대법을 사용하지 않습니다.
5. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 50, 200g

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의해 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 11월 17일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자 : **일동제약주식회사**

본사 서울특별시 서초구 바우외로27길 2

공장 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실:(전화)080-022-1010(수신자부담)

제조자 : (주)퍼슨

충남 천안시 서북구 백석공단로 47