

설사, 묽은 변에 후라베린[®]큐시럽

일반의약품

분류번호

237(정장제)

원료약품 및 분량 (100mL 중)

- 유효성분 : 베르베린탄닌산염(KP)(베르베린으로서 147.5mg) 500.0mg
카올린(BP) 13.2g 펙틴(USP) 200.0mg
- 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 60.0mg 파라옥시벤조산프로필 40.0mg
- 기타 첨가제 : 백당, 수산화나트륨, 에데트산나트륨수화물, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 파인애플
엣센스, 폴리소르베이트20

성상

이 약은 황색의 감미가 있는 현탁시럽제입니다.

효능·효과

설사, 체함, 묽은 변, 토사

용법·용량

성인 : 20mL 1일 3회 식후 잘 흔들어서 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당시 이 첨부문서를 소지하십시오.
수일간 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 1주 이상 계속하여 복용하지 마십시오.
 - 충분한 양의 물과 함께 복용해야 설사로 인한 탈수를 막을 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 90mL

- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2019년 6월 13일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사 : 한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조의뢰자 : 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우포로27길 2 공장 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화) 080-022-1010(수신자부담)

※5030513~1190613

ILDONG